



ANAIS DA 21^A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA
DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE

03 A 07 DE NOVEMBRO

PRESIDENTE PRUDENTE – SP

Normas do Resumo

21^A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO

Prazo limite para inscrição: 24/10/2014 para odontojornada@gmail.com

NORMAS DO RESUMO

O resumo deverá ser **estruturado**, o texto do mesmo deve ser organizado e dividido em seções digitadas em negrito.

TCC:

- **Seções–TCC-Investigação Científica: Introdução, Objetivos, Material e Método, Resultados e Conclusão**
- **Seções – TCC - Relato de caso: Introdução, Objetivos, Relato de caso e Conclusão.**
- **Seções – TCC – Revisão de Literatura: Introdução, Objetivos, Metodologia e Conclusão**

PROJETO:

- **Seções para o Projeto: Introdução, Objetivos, Material e Método (ou Relato de caso ou Metodologia), Forma de análise dos resultados e Resultados Esperados. (Revisão de Literatura e Relato de caso não tem forma de análise dos resultados).**

Deverá conter entre 200 a 250 palavras. Não utilizar parágrafos, formatar em espaço simples, com fonte Arial 12 e formato justificado. O Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 120 caracteres sem espaço, estar em negrito, letras maiúsculas e fonte Arial 12.

INSCRIÇÕES

Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador e ENVIADO pelo ORIENTADOR. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia.

INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL: O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC). É importante que os apresentadores estejam no local com antecedência para testarem rapidamente suas apresentações.

*21ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO*

| 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| manhã | manhã | manhã | manhã | manhã |
| Apresentação de TCC | Apresentação de TCC | Apresentação de TCC | Apresentação de Projetos de | Apresentação de Projetos de |
| 8:00-12:00hs | 8:00-12:00hs | 8:00-12:00hs | 8:00-12:00hs | 8:00-12:00hs |
| Teatro César Cava | Teatro César Cava | Teatro César Cava | Teatro César Cava | Teatro César Cava |
| tarde | tarde | tarde | tarde | tarde |
| Apresentação de TCC | Apresentação de TCC | Apresentação de TCC | Apresentação de Projetos de | |
| 14:00-18:00hs | 14:00-18:00hs | 14:00-18:00hs | 14:00-18:00hs | |
| Teatro César Cava | Teatro César Cava | Teatro César Cava | Teatro César Cava | |

Relação dos Trabalhos Apresentados

*21ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO*

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 03 de novembro (segunda-feira)

| TÍTULO | NOME | ORIENTADOR | BANCA EXAMINADORA |
|--|---|--|--|
| TCC 001 - PERFIL DA CONDIÇÃO ODONTOLÓGICA E SISTÊMICA DE PACIENTES NEFROPATAS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE | GABRIELA MATOS FARAH GISELE ROSA ANDRADE | CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL | ADILSON DE OLIVEIRA GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR |
| TCC 002 - HARMONIZAÇÃO DO SORRISO COM UTILIZAÇÃO DE LENTES DE CONTATO | JEAN MENDES DA SILVEIRA JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS | LUIZ ROBERTO VENTURIM | GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE |
| TCC 003 - O USO DE EXTRATOS NATURAIS É UM MÉTODO APLICAVEL NO CONTROLE DE BIOFILME DE <i>CANDIDA</i> EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL? | MARIANA GODOY LEBEDENCO NATHALIA DAYRELL ARO | FABIANA GOUVEIA STRAIOTO | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| TCC 004 - XEROSTOMIA: ETIOLOGIA E PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS | FERNANDO HENRIQUE D. CASTILHO BEATRIZ JAYNE RODRIGUES | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI | ADILSON DE OLIVEIRA LUCIANA PRADO MAIA |
| TCC 005 - HIV/AIDS: IMPLICAÇÕES SISTÊMICAS E ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS DE INTERESSE PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | ERCILIA MARIA DIAS OLIVEIRA ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA | JOSÉ MARIA BERTÃO | ADILSON DE OLIVEIRA ARLETE GOMES SANTOS PARIZI |
| TCC 006 - AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS | CAROLINA DE JESUS BIRAL NATASHA NARA SOARES BENELLI | CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO | FABIANA GOUVEIA STRAIOTO JOSÉ ANTONIO PEGINO MARQUES |
| TCC 007 - ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS QUE REALIZAM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA | IDENOR GABRIELE POLISINI MARCELO YAMASHITA TAKAHASHI | JOSÉ MARIA BERTÃO | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR |
| TCC 008 - AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM PRÉ-INTERVENÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | LUANA CALVO PEREIRA NAYARA AMIGO GUY | CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL | ADILSON DE OLIVEIRA GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR |
| TCC 009 - SAÚDE BUCAL E GERAL DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS | MARIANA MORESCHI AKIYAMA GIOVANNA ELISA GABRIEL COLETE | CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR |
| TCC 010 - DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA, ETIOLOGIA E TRATAMENTO - REVISÃO DE LITERATURA | AURÉLIO VINÍCIUS PEVERARI VITOR HUGO PEVERARI | CELSO SAWAYA NEVES | FABIANA GOUVEIA STRAIOTO JOSÉ ANTONIO PEGINO MARQUES |

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 04 de novembro (terça-feira)

| | | | |
|--|--|--|---|
| TCC 011 - AVALIAÇÃO DA PREVALENCIA DA MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA | MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA | LUIZ ORBOLATO ROTTA | ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES KARINE TAKAHASHI |
| TCC 012 - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E RESISTÊNCIA À FLEXÃO DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL | ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS DÉBORA DE PAULA NEVES | GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO | ELIANE CRISTINA GAVA PIZI THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE |
| TCC 013 - TRAUMATISMOS DENTARIOS NA DENTIÇÃO DECÍDUA | NATALIA OLIVEIRA NEVES STEPHANE BARBOSA MONTAÑO | KARINE TAKAHASHI | ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES JULIANE AVANSINI MARSICANO |
| TCC 014 - MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA UTILIZANDO MINI-IMPLANTES RELATO DE CASO CLÍNICO | CAINÃ MATEUS ZUCKER TOITO DE LIMA GABRIEL ROCHA BETINELI | ÉLCIO MÁRIO FARIA JÚNIOR LUIZ ORBOLATO ROTTA | ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES JOSÉ ANTONIO PEGINO MARQUES |
| TCC 015 - IMPLANTES IMEDIATOS PÓS EXTRAÇÃO DENTAL: RELATO DE CASO CLÍNICO | ANA CAROLINA SINDONA DE OLIVEIRA CARLOS GLEIDSON DA SILVA SAMPAIO FILHO | VALMIR MACARINI | DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA JOSÉ ANTONIO PEGINO MARQUES |
| TCC 016 - CLAREAMENTO INTERNO EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE-RELATO DE CASO CLINICO | HELEN FERNANDA DOS SANTOS MILENA RUBIA LEITE GONÇALVES | RODRIGO VIEIRA CAIXETA MARCELO POMINI | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LUIZ ROBERTO VENTURIM |
| TCC 017 - TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM MICROABRASÃO – RELATO DE CASO CLÍNICO | CASSIA ETHIENE SATRAIOTTO DE ANDRADE MAYARA GIMENEZ ENRICH | RODRIGO VIEIRA CAIXETA | KARINE TAKAHASHI LUIZ ROBERTO VENTURIM |
| TCC 018 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESE TOTAIS | DAYARA RAMOS BONFIM VIEIRA IRIS FRANCIELLY DE ALMEIDA SILVA | GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES | LUCIANA PRADO MAIA RODRIGO VIEIRA CAIXETA |
| TCC 019 - CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES: EFEITOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E IMPACTOS DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | DAVID JONATHAN R. GUSMAN LEONARDO QUEIROZ TELLES | ROSANA LEAL DO PRADO | JULIANE AVANSINI MARSICANO KARINE TAKAHASHI |
| TCC 020 - RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO – RELATO DE CASO CLÍNICO | AMANDA MAYARA RODRIGUES BRUNA RADTKE DA SILVA | RODRIGO VIEIRA CAIXETA MARCELO POMINI | THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE MARCUS VINICIUS TURINO FERREIRA |
| TCC 021 - INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA NA TOXICIDADE DO CÁDMIO NO OSSO EM RATOS WISTAR | YNGRID COLLETE LUZ KAREN KANADA | CYNTHIA DER TOROSSIAN TORRES NEVES | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI |

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 05 de novembro (quarta-feira)

| | | | |
|---|---|--|---|
| TCC 022 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS | GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA TAYANE CARVALHO ISIDORO DA SILVA | GISELE ALBORGHETTI NAI | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI JOSÉ MARIA BERTÃO |
| TCC 023 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO SOBRE DOIS TIPOS BACTERIANOS | ARIELE SUGUIMOTO DE CRISTÓFANO SUELLEN DE ARAÚJO CÔRTEZ | LIGIA MORAES TEIXEIRA CO-ORIENTADOR: SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO | FABIANA GOUVEIA STRAIOTO GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI |
| TCC 024 - ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DO BIODENTINE: REVISÃO DE LITERATURA | FERNANDA CRISTINA DIAS CONCEIÇÃO TOMÁS SOMBINI DRUZIAN | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI | LIGIA MORAES TEIXEIRA MARCELO POMINI |
| TCC 025 - INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA DE BEBER NAS ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS | BIANCA KELLER DA SILVA LIMA DIOGO MILANI DE MELO | JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI JOSÉ MARIA BERTÃO |
| TCC 026 - AMELOBLATOMA: REVISÃO DE LITERATURA | ANDRESSA FONTANA CARLA RAMOS GROSSO | JOSÉ LUIZ PARIZI | JOSÉ MARIA BERTÃO MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI |
| TCC 027 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES SOLVENTES | FERNANDA CHRISTOVAM SIMÕES FREITAS RODRIGO SILVA PEREIRA | LIGIA MORAES TEIXEIRA | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE |
| TCC 028 - AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE WINTER | ANDRÉ LUIZ DUARTE MIRANDA SÉRGIO ANTÔNIO SEREGHETTI FILHO | DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA | EDISON CALIXTO DA FONSECA MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI |
| TCC 029 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL FRENTE À COLETA DE LIXO ODONTOLÓGICO | CAIO PERES BELLATO FABIO NOBORU KASAE FUDO | ADILSON DE OLIVEIRA | KARINE TAKAHASHI ROSANA LEAL DO PRADO |
| TCC 030 - ANÁLISE IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E OLEO DE COPAÍBA SOBRE O <i>ENTEROCOCCUS FAECALIS</i> | MICHELI GARCIA NASCIMENTO | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA | LIGIA MORAES TEIXEIRA MARCELO POMINI |
| TCC 031 - AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTE RESINOSO E IONOMÉRICO APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES | PATRÍCIA PACITO JACOMINI FLÁVIA IWAMOTO HUGO STARK | KARINE TAKAHASHI | ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE |

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 06 de novembro (quinta-feira)

| TÍTULO | NOME | ORIENTADOR | BANCA EXAMINADORA |
|---|---|--|--|
| PRO 001- AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTES RESINOSOS APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES. | BRENDA ZANFOLIN TORQUATO – HEITOR CEOLIN ARAUJO ISABELA COPETTI FARIA | KARINE TAKAHASHI | LIGIA MORAES TEIXEIRA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| PRO 002- CONCENTRAÇÃO DE FLUORETOS PRESENTES EM DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS E SEU USO EM CRIANÇA DE 0 A 36 MESES DE IDADE | GUILHERME KEESE HENRIQUE FAGUNDES BEZUTTI JÚLIO CEZAR LOZI LACERDA | KARINE TAKAHASHI | LIGIA MORAES TEIXEIRA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| PRO 003- ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE QUE FAZ USO DE TERAPIA ANTIPLAQUETÁRIA | BÁRBARA MIGUÉIS MALUF LORRAINE SOUZA LÉ TAYNÁ DIMITRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR | LIGIA MORAES TEIXEIRA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| PRO 004- MEDIDAS DE PREVENÇÃO PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO A ACIDENTES OCUPACIONAIS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA – REVISÃO DE LITERATURA | AGNES CIAN DE ANDRADE CAROLINE HORII OSTI HELOISE DOMENICE DOS SANTOS | ADILSON DE OLIVEIRA | LIGIA MORAES TEIXEIRA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| PRO 005- PRO 00- AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM TRANSTORNOS DE ANSIEDADE | ARIANE SANTANA NUNES ÉBERTI CRISTOVÃO SANTOS LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | KARINE TAKAHASHI | LIGIA MORAES TEIXEIRA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO |
| PRO 006- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INIBIÇÃO BACTERIANA DO CIMENTO ENDOSEQUENCE BC SOBRE O MICROORGANISMO <i>ENTEROCOCCUS FAECALIS</i> . TESTE <i>IN VITRO</i> . | GUSTAVO SERENA TATIANE DE SOUZA SANTOS VANESSA FARIAS CLIVATI | ERICKE MUCKE SILVA GRAZIELA MORI PANUCCI | ROSANA LEAL DO PRADO KARINE TAKAHASHI |
| PRO 007- AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORAIS E SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA | FERNANDA TENÓRIO DE FREITAS PAMILA CAROLINE DE LIMA VAGNER SANTOS DE ALMEIDA | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR | ROSANA LEAL DO PRADO KARINE TAKAHASHI |
| PRO 008- ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA EM ESCOLAS PÚBLICAS E ESCOLAS PARTICULARES | ANA PAULA BARBOSA SANT'ANA CAMILA MUNHOZ SOARES HELOISA DOS SANTOS FERNANDES | JULIANE AVANISNI MARSICANO | ROSANA LEAL DO PRADO KARINE TAKAHASHI |
| PRO 009- CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO ENDODONTICO: RELATO DE CASO CLÍNICO | ARTHUR TINA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ, RAFAEL FIABANI CORDEIRO, | MARCELO POMINI | ROSANA LEAL DO PRADO KARINE TAKAHASHI |

| | | | |
|--|---|--|--|
| PRO 010- TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DE PACIENTE COM FISSURA LABIAL PRÉ-FORAME UNILATERAL COMPLETA: RELATO DE CASO | GABRIELA ZAMBIANCHI CAETANO LETÍCIA BIUDES DOS SANTOS MARINA MAGRINI ALEXANDRE | ANTONIO CARLOS TREVISAN ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR MARCELO POMINI |
| PRO 011- ASPECTOS BUCAIS E SISTÊMICOS DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE WEST | BLENDA LOBO NOGUEIRA MARIA JOSÉ BORGES | CRISTHIANE OLIVA FERREIRA DO AMARAL | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR MARCELO POMINI |
| PRO 012- A INTER RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA | ANDERSON COUTINHO FELICIO, ARAKEN YAMAMOTO URDIALES, FLAVIA YURI OMAE | ADILSON DE OLIVEIRA | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR MARCELO POMINI |
| PRO 013- REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTE GERIÁTRICO COM FISSURA PALATINA E LABIAL USANDO IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS | BIANCA MARCON FRÉSCA CAROLINE DE MARQUES LUCHETI PALOMA COSTA SANTOS | FABIANA GOUVEIA STRAIOTO | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR MARCELO POMINI |
| PRO 014- AVALIAÇÃO DO USO DO DIMETILSUFÓXIDO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO UTILIZANDO DIFERENTES CIMENTOS RESINOSOS | BIANCA VICENZA GIOPATTO SANDRA NEVES DE BRITO | THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE | GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR MARCELO POMINI |
| PRO 015- VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO VENTRE ANTERIOR DO MÚSCULO DIGÁSTRICO | ANA CLARA CAMARGO DE OLIVEIRA DAVID LUCAS FICHER LUPION MONIQUE GABRIELLY BAIS | CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI RODRIGO VIEIRA CAIXETA |
| PRO 016- AVALIAÇÃO DE RELAÇÃO DO CONTATO PROXIMAL EM RESTAURAÇÕES CLASSE II DE RESINA COMPOSTA | DÊNYS CHRISTIAN PARRON MACEDO JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO KHÊNYA KAROLYNA ROCHA AGUIAR | ELIANE CRISTINA GAVA PIZI | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI RODRIGO VIEIRA CAIXETA |
| PRO 017- AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS ADESIVAS DMSO-WET BONDING E ETHANOL-WET BONDING NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DENTINÁRIA DE SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS | GUILHERME PEREIRA MASI LUCAS ELIAS M. REIS BARBOSA MURILO DE SOUZA | THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI RODRIGO VIEIRA CAIXETA |
| PRO 018- CÉLULAS - TRONCO EM POLPA DENTAL: AVANÇOS TERAPÊUTICOS NA ODONTOLOGIA | CARLA GRIGOLETTO RODRIGUES VIVIAN FAGUNDES | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI RODRIGO VIEIRA CAIXETA |
| PRO 019- ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – RELATO DE CASO CLÍNICO | CAROLINA BENES CARDIA GABRIELA RIBEIRO BRANDÃO LEONARDO SALVADOR PASOTTI | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI RODRIGO VIEIRA CAIXETA |

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 07 de novembro (sexta-feira)

| | | | |
|---|--|--|---|
| PRO 020- AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA DE PACIENTES IRRADIADOS DE CABEÇA E PESCOÇO | EVELYN KELLYN TRINDADE SILVA RAQUEL NARCISO PICCHI YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI | JOSÉ MARIA BERTÃO | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI ADILSON DE OLIVEIRA |
| PRO 021- AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS GÉIS EXPERIMENTAIS DE GOLDONI SOBRE <i>ENTEROCOCCUS FAECALIS</i> | GEOVANA GARCIA CRUZ LORENA OLIVEIRA MENDES NATHÁLIA EVELYN DA SILVA MACHADO | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI ADILSON DE OLIVEIRA |
| PRO 022- O USO DO APARELHO ORTOPÉDICO DE EXPANSÃO MAXILAR TIPO MCNAMARA – RELATO DE CASO CLÍNICO | ARIELE GONÇALVES DA SILVA GUSTAVO BALESTEIRO CARDOSO RAFAEL BRUNO SCUCUGLIA | SÉRGIO VILHEGAS | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI ADILSON DE OLIVEIRA |
| PRO 023- AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO BIODENTINE™ E MTA® SOBRE <i>ENTEROCOCCUS FAECALIS</i> | GABRIELE ANDRADE SANTOS SAMARA ANGELICA ENZ BRUNO ALMEIDA FERNANDES, | GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI | ARLETE GOMES SANTOS PARIZI ADILSON DE OLIVEIRA |
| PRO 024- ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS SISTÊMICAS E ESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE | CAROLINE SOARES NARDELI ISABELA CAROLINE SAITO JULIANA SUGUIMOTO VALÉRIO | CRISTHIANE OLIVA FERREIRA DO AMARAL | JULIANE AVANSINI MARSICANO ERICKE MUCKE SILVA |
| PRO 025- EFEITOS DO USO DE PREBIÓTICOS NA PROGRESSÃO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA POR LIGADURA EM RATOS | GABRIELA DA SILVA NOVAIS JÉSSICA LOZANO CAPELOTI RAISA BALDO DIAS | LUCIANA PRADO MAIA HERMANN BREMER NETO | JULIANE AVANSINI MARSICANO ERICKE MUCKE SILVA |
| PRO 026- AVALIAÇÃO DA VISÃO DA CRIANÇA FRENTE AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | CAMILA TERESINHA NASCIMENTO DE ARAÚJO LARA RÚBIA MIOTTO FERREIRA DOS SANTOS NATANI CARLA CRISTOVAM | KARINE TAKAHASHI | JULIANE AVANSINI MARSICANO ERICKE MUCKE SILVA |
| PRO 027- CIRURGIA PARENDODÔNTICA COM OBTURAÇÃO SIMULTÂNEA DOS CANAIS: RELATO DE CASO | KEILA CRISTINA CRESCÊNCIO ESPÓSITO TAMIRES HENRIQUE DE OLIVEIRA | MARCELO POMINI | JULIANE AVANSINI MARSICANO ERICKE MUCKE SILVA |
| PRO 028- DSD-DIGITAL SMILE DESIGN: RELATO DE CASO CLÍNICO | VITOR NOVAES DE MORAES LEONARDO DEL POZZO SANTANA WELLINGTON MARCEL SOARES ALVES | GRAZIELA AVILA GALHANO LOGAN | JULIANE AVANSINI MARSICANO ERICKE MUCKE SILVA |

Menção Honrosa - Trabalhos de Conclusão de Curso

*21ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO*

1º. lugar:

AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E RESISTÊNCIA À FLEXÃO DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL

DÉBORA DE PAULA NEVES, ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS, GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO.

2º. lugar:

PERFIL DA CONDIÇÃO ODONTOLÓGICA E SISTÊMICA DE PACIENTES NEFROPATAS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

GABRIELA MATOS FARAH, GISELE ROSA ANDRADE, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL

3º. lugar:

AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS

CAROLINA DE JESUS BIRAL, NATASHA NARA SOARES BENELLI, CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO,

INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA NA TOXICIDADE DO CÁDMIO NO OSSO EM RATOS WISTAR

KAREN KANADA, YNGRID COLLETE LUZ, CYNTHIA D. T. TORRES NEVES.

Menção Honrosa - Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso

*21ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO*

1º. lugar:

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE QUE FAZ USO DE TERAPIA ANTIPLAQUETÁRIA

BÁRBARA MIGUÉIS MALUF, LORRAINE SOUZA LÉ, TAYNÁ DIMITRIA DE OLIVEIRA
ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR.

2º. lugar:

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE

ARIANE SANTANA NUNES, EBERTI CRISTOVÃO SANTOS, LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS
SANTOS, KARINE TAKAHASHI.

3º. lugar:

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO A ACIDENTES OCUPACIONAIS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA – REVISÃO DE LITERATURA

AGNES CIAN DE ANDRADE, CAROLINE HORII OSTI, HELOISE DOMENICE DOS SANTOS,
ADILSON DE OLIVEIRA, RODRIGO CAIXETA.

Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso

21^A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO

TCC 001

PERFIL DA CONDIÇÃO ODONTOLÓGICA E SISTÊMICA DE PACIENTES NEFROPATAS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

GABRIELA MATOS FARAH, GISELE ROSA ANDRADE, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma alteração sistêmica que consiste em perda da função renal, sendo necessário o tratamento de hemodiálise. O paciente em hemodiálise pode apresentar amplas repercussões sistêmicas, incluindo aspectos laboratoriais e múltiplas complicações que podem apresentar implicações no tratamento odontológico. **Objetivos:** avaliar a condição de saúde bucal e sistêmica de pacientes nefropatas submetidos à hemodiálise, verificando a frequência e os tipos de danos sistêmicos que interferem na abordagem odontológica. **Materiais e métodos:** foram avaliados 66 pacientes em hemodiálise através de: Índice CPO-D, necessidade de abordagem periodontal, necessidade de exodontia, necessidade de prótese dentária, avaliação da condição sistêmica: valores da uréia, valores da hemoglobina e do hematócrito. **Resultados:** (72,7%) Gênero masculino e (27,3%) do feminino, faixa (53 ± 12 anos), média da uréia pré-hemodiálise: 133 (± 35) e pós-hemodiálise: 52 (± 21), (91%) anemia, (77%) hipertensão, (31%) Diabetes. Quanto à saúde bucal encontramos: CPO-D médio: 20,4 ± 7,3 necessitavam de: Cirurgia 34%, Periodontia 71%, Dentística 39%, Prótese 43%. **Conclusão:** Existe uma grande variabilidade entre as características sistêmicas encontradas nos pacientes avaliados que podem repercutir no tratamento odontológico como: uremia, anemia, hipertensão, diabetes, além da própria doença renal e o tratamento de hemodiálise. Quanto à condição de saúde bucal verificamos que é deficiente, com grande necessidade de tratamento acumulada, necessitando de vários tipos de abordagem: cirurgia, periodontia, dentística e prótese. O Cirurgião-Dentista deve ser capacitado para atender o paciente submetido à hemodiálise, pois comumente manifestam complicações sistêmicas que podem influenciar no plano de tratamento.

JEAN MENDES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS, LUIZ ROBERTO VENTURIM.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

Introdução: Nos tempos atuais cada vez mais se tem como meta ter um “sorriso perfeito”, pois um sorriso bonito é um referencial de sucesso e autoestima. Com isso ocorreu na odontologia, o desenvolvimento de tecnologias que tornasse isso possível, e a partir daí criou-se a técnica com lentes de contato feitas de laminado cerâmico, que são facetadas de porcelana ultra finas cimentadas no dente, que corrigem diastemas, manchas intrínsecas, deficiência de tamanho e forma, entre outros problemas e harmonizam o sorriso, dando ao paciente um ótimo resultado estético. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi relatar um caso de reabilitação do sorriso com a confecção de facetadas cerâmicas ultrafinas, denominadas também de lentes de contato, corrigindo pequenos diastemas com valorização da estética. **Relato de Caso:** Paciente C.L.S., 19 anos, gênero feminino, procurou a clínica de Clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, com a queixa principal de diastema e dentes pequenos. Foi indicado para o caso lentes de contato dental (laminados cerâmicos) nos dentes 12, 11, 21 e 22, que restabeleceu a harmonia e estética do sorriso usando um tratamento conservador. **Conclusão:** As lentes de contato foram uma alternativa conservadora com desgaste minimamente invasivo que devolveram a harmonia do sorriso e deu uma boa estética ao final do tratamento.

TCC003

O USO DE EXTRATOS NATURAIS É UM MÉTODO APLICÁVEL NO CONTROLE DE BIOFILME DE *CANDIDA* EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL?

MARIANA GODOY LEBEDENCO, NATHALIA DAYRELL ARO, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A literatura mostra correlação entre má higiene, candidíase atrófica crônica e o risco de instalação de infecções pulmonares, por isso o controle da higiene bucal dos portadores de próteses totais, é indispensável programa de orientação, o emprego de materiais e métodos de higiene eficientes. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi avaliar a literatura odontológica quanto a eficácia do uso de extratos naturais como alternativas para controle de biofilme de *Candida*. **Metodologia:** Bases de dados foram acessadas para realização da pesquisa de, na língua Portuguesa e Inglesa entre os anos de 2000 a 2014. As bases de dados acessadas foram: MEDLINE/PUBMED, Scielo e Lilacs. As palavras chaves usadas foram: biofilme (biofilm), *Candida*, extrato natural (natural extract), (respiratory infections). **Resultados:** A manifestação crônica da candidose eritematosa pode ocorrer tradicionalmente associada não só ao uso e prótese como também a queilite angular. Os compostos naturais tem merecido muito interesse nas últimas décadas no combate sobre as doenças infecciosas humanas, entre estes estão: *Arnica montana*, *Urtica dioica*, *Própolis* entre outros. **Conclusão:** O controle de biofilme de *Candida* é necessário e tem sido amplamente investigado, com resultados aplicáveis tanto ao desenvolvimento de novos produtos ou com impacto em saúde pública. Considerando o aumento da incidência de patógenos resistentes aos antifúngicos a desenvolvimento de compostos com extratos naturais tem mostrado um futuro promissor.

TCC004

XEROSTOMIA: ETIOLOGIA E PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS

BEATRIZ JAYNE RODRIGUES, FERNANDO HENRIQUE D. CASTILHO, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A saliva tem um papel muito importante na cavidade bucal, contém componentes antimicrobianos, imunoglobulinas, proteínas e eletrólitos com propriedades de tamponamento. Atua na proteção da boca e do epitélio gastrointestinal, umedece os tecidos e ainda, sua propriedade lubrificante auxilia na formação do bolo alimentar, na fonética e é essencial na retenção de próteses totais. A xerostomia é uma manifestação subjetiva e objetiva de secura na boca e indica diminuição da quantidade ou também a qualidade da saliva produzida. Suas principais causas são os medicamentos xerostômicos, doenças sistêmicas e tratamentos que utilizam a radiação. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre a etiologia e os princípios terapêuticos da xerostomia. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos e livros disponíveis na biblioteca do campus I da Universidade do Oeste Paulista e em bases de dados on-line sobre a literatura em questão. Realizou-se uma busca não sistemática no período compreendido entre 2004 a 2014, em que as bases de dados foram da PUBMED, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme: LILACS, MEDLINE, Scielo e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). **Conclusão:** Concluiu-se com esse estudo que é de grande importância a identificação do quadro de xerostomia, bem como determinar sua possível causa, em decorrência da multiplicidade de fatores etiológicos envolvidos. Os tratamentos mais utilizados são para a diminuição ou eliminação do fator causal, além do uso de substâncias sistêmicas ou tópicas para restabelecer as funções normais das glândulas ou para o alívio dos sinais e sintomas apresentados.

TCC005

HIV/AIDS: IMPLICAÇÕES SISTÊMICAS E ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS DE INTERESSE PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

ERCILIA MARIA DIAS OLIVEIRA, ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA, JOSÉ MARIA BERTÃO.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Aproximadamente na década de 80 acentuou-se a síndrome da imunodeficiência no Brasil. A epidemia tem sido uma das maiores preocupações para o setor da saúde pública mundial até os dias atuais, com a combinação de três agentes antirretrovirais contra pelo menos dois alvos moleculares distintos é a base para prevenir a resistência aos medicamentos em evolução e conseqüentemente diminuir as manifestações bucais. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi abordar as implicações sistêmicas e alterações estomatológicas em pacientes HIV/AIDS, bem como tipos de medicamentos utilizados e os cuidados e condutas que podem ser adotados durante o tratamento odontológico destes pacientes. **Metodologia:** O estudo é uma revisão de literatura, em que foram buscados artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS (LILACS, IBECs, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO) e PubMed. As estratégias de busca utilizadas incluíram o uso dos termos: HIV/Aids, Imunodeprimidos, Manifestações bucais, Odontologia, foram selecionadas referências entre os anos de 2000 a 2014. **Conclusão:** Concluímos através de nosso estudo que há prevalência de manifestações sistêmicas em pacientes imunocomprometidos, são transtornos cognitivos, motor menor e demência as pneumonias adquiridas, distúrbios reumáticos e episódios autoimunes. As acomete a cavidade bucal pelo vírus do HIV são Candidíase, Leucoplasia pilosa, EGL (Eritema gengival Linear), GUN (gengivite ulcerativa necrosante), PUN (periodontite ulcerativa necrosante), Sarcoma de Kaposi e Linfoma não-Hodgkin. O profissional deve atender qualquer indivíduo como se fosse altamente infectado, tomando-se os devidos cuidados com a biossegurança, já que não é possível diferenciar clinicamente um indivíduo infectado de um não infectado.

TCC006

AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS

CAROLINA DE JESUS BIRAL, NATASHA NARA SOARES BENELLI, CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO,
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Uma característica da população idosa é a prevalência do edentulismo o qual implica na qualidade de vida do paciente, causando-lhe queda na qualidade nutricional, funcional e emocional. Com essa ausência dental, o uso de próteses totais faz-se necessário. A higienização dessas tem sido precária por falta de orientação adequada ou, mesmo, por negligência dos portadores. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo conhecer os métodos e hábitos de higiene de próteses totais utilizadas por idosos, assim como avaliar o conhecimento dos portadores de prótese total sobre métodos de higienização e se receberam orientações adequadas sobre como realizá-la. **Material e Método:** foi aplicado um questionário de 20 questões fechadas, em 89 portadores de próteses totais, abordando história do aparelho protético e modo de limpeza utilizado por eles. **Resultados:** a maioria dos usuários foi do gênero feminino (60,67%); a faixa etária, entre 65 e 75 anos, predominou, resultando em 34,09%. Dos que utilizavam próteses totais maxilares e mandibulares, 56,82% estavam insatisfeitos, enquanto os que usavam apenas maxilares, 53,33%, estavam satisfeitos. Demonstrou, também, que os que a utilizam por mais de 20 anos, são insatisfeitos (50,0%). Dos entrevistados, 74,16% não foram orientados quanto a retornos periódicos; 58,43%, quanto à higienização; e 92,94% quanto ao uso noturno. 52,33% realizam a higienização 3 vezes ao dia, quando 97,73% utilizam escova comum e 87,64% associam dentifrícios a elas. **Conclusão:** a negligência dos cirurgiões-dentistas, quanto às orientações essenciais sobre cuidados pós instalação das próteses, reflete em uma menor vida útil delas e higiene bucal precária.

TCC007

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS QUE REALIZAM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

IDENOR GABRIELE POLISINI, MARCELO YAMASHITA TAKAHASHI, JOSÉ MARIA BERTÃO.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: É notório observar a grande mortalidade que o vírus da imunodeficiência adquirida(HIV) acarretou para humanidade, sendo a terapia antirretroviral(TARV) a forma mais eficaz de intervenção e para melhoria na qualidade de vida em portadores do vírus do HIV/AIDS. Porém, existem possíveis efeitos colaterais dos diversos medicamentos antirretrovirais(ARV), causando entre as principais comorbidades relatadas, as alterações hematológicas, dentre elas, diferentes tipos de anemia, leucopenia e plaquetopenia. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre os diversos tipos de tratamentos antirretrovirais em pacientes portadores de HIV/AIDS e as possíveis causas das alterações hematológicas causadas pelo tratamento. **Metodologia:** Foi selecionado 54 artigos das bases de dados: Pubmed e BVS(Biblioteca Virtual em Saúde), apurado pelas palavras chaves definidas, apresentando critérios para desenvolvimento da pesquisa, elaboramos uma revisão literária. **Conclusão:** Concluiu-se que pacientes HIV positivo, apresentam redução nos número de leucócitos, hemoglobina e índice de massa corporal(IMC). Apresentando maior comprometimento hematológico e metabólico, e estão suscetíveis a infecções oportunistas durante a progressão da doença, apresentou grande risco de mortalidade para aqueles que não faziam o tratamento indicado.

TCC008

AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM PRÉ-INTERVENÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR

LUANA CALVO PEREIRA, NAYARA AMIGO GUY, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: É muito importante que os pacientes que se submeterão a cirurgias cardiovasculares apresentem uma boa qualidade de saúde bucal, sem a presença de focos, ou condição precursora de infecções na cavidade bucal. **Objetivo:** avaliar a condição de saúde bucal que se encontravam os pacientes cardiopatas internados em pré- intervenção de cirurgia cardíaca, observando o índice de necessidade de tratamento invasivo, pois a presença destes fatores negativos pode levar a complicações na cavidade bucal e saúde geral. **Material e Método:** Foram avaliados 75 voluntários sobre: condições sistêmicas e realizado exame físico buco-dentário para averiguação das condições de saúde bucal e avaliando a presença de necessidades de procedimentos invasivos. **Resultados:** 69,3% gênero masculino e 30,7% feminino, motivo da internação para procedimento cirúrgico: Cardiopatia congênita (4%), Colocação de Stent (7%), Cateterismo (8%), Marcapasso (16%), Revascularização (24%), Valvuloplastia (41%). Alterações sistêmicas associadas: Hipertensão (62%), Diabetes (23%), auto percepção bucal: Excelente e boa (51%) regular e ruim (49%), Necessidade de tratamento invasivo: Tratamento Periodontal (100%), Tratamento Restaurador(45%), Tratamento Cirúrgico (32%), Endodontia (20%), Dor de origem odontológica (4%), Presença Abscesso (2%). **Conclusão:** Concluímos que houve predominância de cirurgia de valvuloplastia, seguido de revascularização, a maioria apresentavam uma ou mais doença associada à cardiopatia, neste caso: hipertensão e diabetes, os pacientes avaliados apresentavam necessidade de tratamento cirúrgico, tratamento endodôntico, presença de abscesso, tratamento periodontal, tratamento restaurador e dor de origem dentária, todos com possibilidade de formação de focos infecciosos, podendo levar a complicações na cavidade bucal e saúde geral.

MARIANA MORESCHI AKIYAMA, GIOVANNA ELISA GABRIEL COCLETE, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DOS AMARAL.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Os anticoagulantes são substâncias que retardam a coagulação, pois são drogas antagonistas da vitamina K, que atuam sobre os fatores de coagulação. Os anticoagulantes reduzem o risco de tromboembolismo, mas este paciente quando necessita de cirurgias tem seu risco hemorrágico muito aumentado. **Objetivo:** Avaliar a condição de saúde bucal e geral dos pacientes em uso de anticoagulantes orais, verificando: dificuldade destes pacientes em obter tratamento odontológico, histórico de intercorrências hemorrágicas no trans e pós-operatório bem e valor do INR. **Material e Método:** Foram analisados 35 pacientes em uso de anticoagulante oral, estes foram submetidos a um formulário estruturado, composto por anamnese: abordando condição de saúde geral: doença de base, doenças associadas, valores laboratoriais e a um exame físico buco dental, avaliando: presença e ausência de necessidade de tratamento. **Resultado:** (65%) Gênero masculino e (45%) do feminino, a doença de base mais prevalente: Válvula metálica (37%), doenças associadas hipertensão (45%), Diabetes (25%). Valores do INR de 2,0 a 3,0 (31%), abaixo de 2,0 (26%) acima de 3,0 (43%). Necessitavam de: Cirurgia 14%, Periodontia 68%, Dentística 51%, Prótese 31%. **Conclusão:** a condição de saúde bucal se encontrava deficiente, necessitando de tratamentos invasivos, dentre as doenças a mais prevalente foi a utilização de válvula metálica, a hipertensão e diabetes foram encontradas neste grupo, uma porcentagem dos pacientes tiveram dificuldade em encontrar atendimento, alguns pacientes tiveram intercorrências hemorrágicas após exodontia, a maioria se encontravam com o valor do INR acima de 3,0, com alto risco para hemorragia durante procedimentos cirúrgicos odontológicos.

TCC010

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA, ETIOLOGIA E TRATAMENTO - REVISÃO DE LITERATURA

AURÉLIO VINÍCIUS PEVERARI, VITOR HUGO PEVERARI, CELSO SAWAYA NEVES.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida como uma dor, localizada nos músculos da mastigação, região pré-auricular, e/ou na articulação temporomandibular (ATM), sendo esta articulação constituída por uma ligação móvel entre o osso temporal e a mandíbula. O deslocamento do disco assintomático não provoca qualquer distúrbio funcional, como estalidos, movimentos irregulares ou limitação de abertura, no entanto, a ausência de ruídos na ATM não significa que se encontre bem posicionada. **Objetivo:** Objetivo deste estudo foi revisar na literatura a sintomatologia, etiologia e tratamento da disfunção temporomandibular com o intuito de ampliar os conhecimentos dos acadêmicos e profissionais sobre este assunto. **Metodologia:** Foi executada uma revisão da literatura no período compreendido entre 1997 a 2014, em que as bases de dados foram retirados na: BVS, BDTD, Pub Med. Foi também consultado em revistas e periódicos disponíveis na biblioteca do campus I na Universidade do Oeste Paulista. **Conclusão:** Concluímos por meio desta revisão da literatura que os principais sintomas da DTM são: cefaleias, dores na face/pescoço de origem muscular ou articular e limitação de abertura bucal. As principais etiologias são: ausência dental, maloclusão, estresse e bruxismo/apertamento dental. Os principais tratamentos são: placa miorrelaxante, fisioterapia com laserterapia, medicamentos, psicoterapia, ajuste oclusal, reconstrução oclusal com próteses e/ou implantes e cirurgia em casos específicos.

GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA, MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS, LUIZ ORBOLATO ROTTA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Maloclusão é o termo utilizado para se definir toda alteração relacionada com o posicionamento incorreto dos dentes nos arcos dentários e o relacionamento inadequado entre os arcos dentários superiores e inferiores, que por sua vez produzem uma função mastigatória ineficiente. **Objetivo:** Este estudo avaliou o índice de maloclusão presente nos indivíduos que estavam na fase de transição da dentição decídua para a dentição permanente. **Material e Método:** Foram selecionados aleatoriamente 227 exames complementares como modelos de gesso e fotos intra-orais das bocas de indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 6 e 14 anos que procuraram serviço de uma clínica particular para avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico; foram avaliadas as alterações ântero-posteriores pela classificação de Angle para se determinar a presença de Classe I, II ou III; as alterações transversais para se identificar a existência de mordida cruzada, e as alterações verticais para se definir a presença de mordidas abertas ou sobremordida. **Resultados:** Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente com auxílio do software Epi-Info 3.4.1 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta, USA) e do software STATISTICA. Observou-se que o índice mais prevalente foi classe I, com 42,3% dos casos, seguido da sobremordida com 37,3% e por fim classe II divisão 2, com 28,6%. A maloclusão menos prevalente encontrada foi mordida aberta posterior com 0,4%, não havendo diferenças estatisticamente entre os gêneros. **Conclusão:** Concluiu-se que a maloclusão com maior prevalência é a Classe I de Angle seguido da sobremordida, não existe predominância quanto ao gênero, ressaltando-se ainda a importância de um diagnóstico precoce com finalidade de se evitar problemas futuros na dentição permanente.

TCC012

AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E RESISTÊNCIA À FLEXÃO DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL

DÉBORA DE PAULA NEVES, ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS, GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A técnica de processamento das cerâmicas odontológicas esta diretamente relacionada às características finais destes materiais. **Objetivo:** Avaliar a adaptação marginal e a resistência flexural da cerâmica de dissilicato de lítio processada pela técnica CAD/CAM e técnica convencional. **Material e Método:** Para avaliação da adaptação marginal foram confeccionados 10 modelos a partir de um troquel metálico, sobre os quais foi realizado o escaneamento, desenho das infraestruturas e a fresagem para obtenção das peças cerâmicas e.max CAD com o sistema Cerec (n=10). Sobre estes mesmos modelos foram confeccionados os copings para a injeção convencional, usando a técnica para e.max Press (n=10). A análise da discrepância marginal foi feita em 12 pontos da margem do troquel metálico, e os valores foram submetidos à média aritmética. Para avaliação da resistência flexural foram confeccionados 10 discos de cera com dimensões de 14mm diâmetro por 1,2mm de altura, com os quais foi realizada a confecção de corpos de prova através da técnica de injeção emax Press. A partir do molde destes discos foram confeccionados os corpos de prova com o sistema CAD/CAM. Para avaliação da resistência flexural foi realizado o teste de flexão biaxial sobre três esferas, e os resultados obtidos foram calculados através da equação determinada pela norma da ASTM F-394-. **Resultados:** Houve semelhança estatística na adaptação marginal da técnica de injeção ($115.7\mu\text{m} \pm 31.3 \mu\text{m}$) e do sistema CAD/CAM ($113.6 \mu\text{m} \pm 26.9 \mu\text{m}$) e a resistência a flexão biaxial também foi semelhante entre o grupo injeção ($214.82 \pm 39.51 \text{ MPa}$) e CAD/CAM ($216.01 \pm 25.95 \text{ MPa}$). **Conclusão:** Concluimos que não houve diferença estatisticamente significativa quando comparado a técnica CAD/CAM com a técnica Convencional. Podendo ser ambas indicadas com segurança.

NATÁLIA OLIVEIRA NEVES, STEPHANE BARBOSA MONTANO, KARINE TAKAHASHI.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Os traumatismos dentários são uma das principais ocorrências na odontologia, os mais frequentes traumas ocorrem na primeira infância, na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, quando as crianças iniciam suas atividades como, aprender a dar seus primeiros passos, brincar e correr, uma vez que sua coordenação motora não está ainda bem estabilizada. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura a respeito dos traumatismos dentários na dentição decídua para estabelecimento de um padrão de acometimento e formas de tratamento e prevenção. **Metodologia:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratórias em bases de dados com busca online no período compreendido de 2000 a 2014, em que foram revisados artigos com as seguintes palavras-chave: injúria traumática, traumatismo dentário, TDI, dente decíduo, infantes e criança. As bases de dados utilizadas foram as da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Conclusão:** Verificou-se que os traumatismos dentários na dentição decídua acometem com maior frequência crianças de 1 a 3 anos de idade e do gênero masculino, os dentes mais acometidos são os incisivos superiores e as quedas são os fatores etiológicos mais comuns. Existem diferenças entre trabalhos publicados quanto a idade de acometimento e procura por atendimento, inerentes a região estudada.

TCC014

MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA UTILIZANDO MINI-IMPLANTES RELATO DE CASO CLÍNICO

CAINÃ MATHEUS ZUCKER TOITO DE LIMA, GABRIEL ROCHA BETINELI, ÉLCIO MÁRIO FÁRIA JÚNIOR.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Todo movimento ortodôntico requer uma fonte de apoio que possa suportar determinada força, a qual se denomina ancoragem. Os mini-implantes surgiram como alternativa viável de ancoragem máxima, já que os mesmos são estabilizados no osso alveolar e funcionam como apoio para a movimentação dentária. Sua instalação é fácil, não compromete a estética, baixo custo e tem boa aceitação por parte dos pacientes. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo demonstrar o fechamento do espaço do primeiro molar superior esquerdo perdido há dez anos, através da mesialização do segundo molar superior esquerdo, com auxílio do mini-implante como ancoragem. **Relato de caso:** Paciente do gênero feminino, 35 anos de idade, procurou o ortodontista em decorrência de perdas dentárias prematuras e alinhamento dental, o espaço protético perdido na arcada superior foi de 6 mm, e na arcada inferior foi de 12mm. No arco inferior foi planejada a colocação de um implante osseointegrado como forma de tratamento, já no arco superior uso de mini-implante como dispositivo de ancoragem. Auxiliando assim no fechamento do espaço protético superior através da mesialização do segundo e terceiro molares, sem efeito indesejável no segmento anterior do arco. **Conclusão:** O dispositivo mini-implante como alternativa de ancoragem máxima foi eficaz, permitindo que os objetivos propostos pelo plano de tratamento fossem alcançados, em especial a mesialização do segundo molar superior esquerdo.

IMPLANTES IMEDIATOS PÓS-EXTRAÇÃO DENTAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

ANA CAROLINA SINDONA DE OLIVEIRA, CARLOS GLEIDSON DA SILVA SAMPAIO FILHO,
VALMIR CAMPOS MACARINI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A perda dos dentes naturais é frustrante, abala a auto confiança e frequentemente prejudica a vida afetiva, profissional e social dos indivíduos. Considerando as necessidades estéticas e funcionais geradas por este fato, tentativas reabilitadoras têm sido propostas a fim de obter a adequada substituição dental. **Objetivo:** Demonstrar por meio de um relato de caso clínico, a efetividade do tratamento com implantes imediatos, com manutenção da papila e de tecidos de suporte. **Relato de Caso:** Foi selecionado um paciente de 30 a 40 anos do gênero feminino, sem nenhuma patologia sistêmica, para receber um tratamento de reabilitação utilizando implante osseointegrados. Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foi diagnosticado doença periodontal, com mobilidade e perda óssea nos elementos dentais 11 e 21, desta forma foi realizado a extrusão, com posterior extração dos mesmos e reabilitação do paciente na mesma sessão, com implantes osseointegrados. Sendo assim, ficou confirmado que a utilização da carga imediata, é uma excelente opção para atender a expectativa do paciente e do profissional. **Conclusão:** Concluimos que o implante de carga imediata, com a colocação do provisório, funciona na manutenção das papilas e tecidos de suporte, devolvendo assim ao paciente a função fonética e estética iniciais por se tratar de área anterior superior.

TCC016

CLAREAMENTO INTERNO EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE-RELATO DE CASO CLÍNICO

HELEN FERNANDA DOS SANTOS, MILENA RUBIA LEITE GONÇALVES, MARCELO POMINI, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: No caso de clareamento interno apenas o tratamento estético não se resolve o problema, uma vez que, descobrir e tratar a causa do escurecimento neste caso fundamental para que depois possamos conciliar com os tratamento restauradores. As alterações cromática intrínsecas são provocadas por diversos fatores que requer atenção durante o exame clínico para maior previsibilidade dos resultado do caso. Fatores locais (hemorragia, matérias odontológico na câmara pulpar, entre outros). e sistêmico (causas congênitas, amelogenese, dentinogenese imperfeita fluorose, entre outros). **Objetivo:** objetivo deste trabalho é demonstrar um tratamento de discromia em dente tratado endodonticamente, utilizando materiais odontológicos e técnica com comprovação científica em nossa literatura. **Relato de Caso:** Paciente queixando-se da estética de seu sorriso compareceu à Clínica e diante do diagnóstico foi proposto clareamento dental interno com pasta de perborato de sódio e água destilada que teve explicações sobre suas vantagens e desvantagens. A possibilidade de fazer um tratamento conservador e mais seguro foram fatores decisivos para a escolha da técnica e, ainda por poder satisfazer os anseios da paciente com o restabelecimento da cor de seu dente e a harmonia e seu sorriso **Conclusão:** Conclui-se que o clareamento dental interno possui riscos efeitos colaterais que deve ser conhecidos pelo o profissional para poderem ser minimizados e controlados a fim de possibilitar um tratamento estético nos dentes escurecidos e dentes despulpados

TCC017

TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM MICROABRASÃO - RELATO DE CASO CLINICO

CASSIA ETHIENE STRAIOTTO DE ANDRADE, MAYARA GIMENEZ ENRICH, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A sociedade impõe padrões de estética na odontologia que são tidas como “normal”, ou seja, o paciente busca satisfação estética de seu sorriso baseando-se naquilo que vê e ouve no seu dia a dia. Dessa forma, ouvir o paciente ajuda tanto no plano de tratamento do caso quanto no diagnóstico, uma vez que, manchas no esmalte dentário podem ser diagnosticadas como hipoplasias idiopáticas ou ter diversas etiologias como: amelogênese imperfeita, fluorose, entre outras. Tratamentos mais conservadores como a microabrasão têm sua aplicação principalmente na eliminação de manchas e defeitos superficiais em esmalte com a vantagem de preservar maior quantidade de estruturas dentais. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento de um dente com mancha superficial no esmalte utilizando a técnica da microabrasão. **Relato de caso:** Paciente apresentou-se para o tratamento, queixando-se da estética do canino superior esquerdo. O tratamento de microabrasão foi escolhido depois de realizado o diagnóstico do caso (hipoplasia). Foram observados os sinais e sintomas e foi definido o plano de tratamento, baseando em evidências científicas, sobre materiais e técnicas atuais para contemplar as expectativas. **Conclusão:** No caso clínico relatado pode-se perceber que a técnica da microabrasão mostrou-se segura, rápida, eficiente, conservadora e de baixo custo na remoção de mancha branca hipoplásica inativa, com mínima intervenção e em única sessão, sem oferecer desconforto à paciente.

TCC018

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESES TOTAIS

DAYARA RAMOS BONFIM VIEIRA, IRIS FRANCIELLY DE ALMEIDA SILVA, GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO, ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A qualidade das próteses totais tende a diminuir com o tempo de uso, principalmente a partir do quarto ano e após o oitavo ano de uso, uma grande parte dos pacientes apresentam problemas mastigatórios. Embora seja possível verificar clinicamente um grande desgaste das próteses utilizadas por longos anos, é muito comum encontrarmos pacientes que utilizam a mesma prótese por mais de 10 anos. **Objetivo:** Este estudo avaliou a correlação entre a autopercepção de saúde bucal de pacientes idosos portadores de próteses totais antigas e a real eficiência mastigatória destas próteses. **Material e Método:** Foi realizado um estudo in vivo, cego e aleatorizado, que teve como fatores de estudo a autopercepção de saúde bucal que foi analisada através de questionário do índice OHIP-EDENT e a eficiência mastigatória de próteses totais avaliadas através do método de tamises. Foram eleitos 20 pacientes acima de 60 anos e usuários de próteses totais bi maxilares há mais de 6 anos. Em seguida, foram avaliados a correlação entre a autopercepção de saúde bucal do paciente e a real eficiência mastigatória que a prótese oferece. **Resultados:** Foi observada uma baixa correlação entre os dados obtidos pelo questionário OHIP (3,23) e a eficiência mastigatória das próteses (7,58). Indicando que, embora apresentem uma baixa eficiência mastigatória, os pacientes possuem uma baixa autopercepção deste problema,. **Conclusão:** Não foi observada correlação entre a autopercepção de saúde bucal dos pacientes e a real eficiência mastigatória.

TCC019

CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES: EFEITOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E IMPACTOS DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DAVID JONATHAN RODRIGUES GUSMAN, LEONARDO QUEIROZ TELLES, ROSANA LEAL DO PRADO.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A polarização da cárie dentária é um fenômeno mundial, acometendo a população socialmente desfavorecida. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da cárie dentária em pré-escolares de escola pública e privada, avaliando sua associação a fatores socioeconômicos e impactos do projeto de extensão universitária. **Materiais e Métodos:** Foram incluídos pré-escolares aos 5 anos, alocados em 3 grupos: G1 – crianças de colégio privado, sem projeto preventivo em saúde bucal (n=13); G2 – crianças de ensino público também sem cuidados preventivos regulares (n=20); G3 – pré-escolares de ensino público que recebem cuidados preventivos através de projeto de extensão universitária (n=24). Na coleta de dados foram utilizados formulário de caracterização socioeconômica e ficha de exame para avaliação do índice ceo-d, semelhantes aos do projeto SB-Brasil 2010. Os pais/responsáveis pelas crianças foram entrevistados em relação aos fatores socioeconômicos e, as crianças, examinadas para a verificação da prevalência de cárie. Para análise dos dados foi utilizado o teste de Fisher ($p < 0,05$). **Resultados:** A escola G1 mostrou condições socioeconômicas e bucais mais favoráveis (ceo=1,40) que a G3 (ceo=2,92). A escolaridade dos pais esteve associada à presença de doença nos filhos ($p < 0,05$), porém, a renda não demonstrou associação. **Conclusão:** A cárie dentária foi mais prevalente no grupo com piores indicadores socioeconômicos, apesar do projeto de extensão universitária em saúde bucal, o qual não foi capaz de superar as desigualdades em saúde.

TCC020

RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO - RELATO DE CASO CLÍNICO

AMANDA MAYARA RODRIGUES, BRUNA RADTKE DA SILVA, MARCELO POMINI, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: As resinas compostas têm boa aplicação em reconstruções de dentes cariados ou fraturados devido: plasticidade, matização, textura, opacidade e translucência. Cavidades pequenas e grandes reconstruções em dentes anteriores e posteriores têm sido realizadas com a utilização de resinas compostas. As restaurações diretas em resinas compostas restabelecem a função, a biomecânica e a estética do dente e muitas vezes quando existe uma grande perda das estruturas dentais há necessidade de retentor intrarradicular. O pino de fibra de vidro tem módulo de elasticidade parecido com o da dentina e distribui as tensões adequadamente com comportamento biomecânico favorável, pois, cimentado adesivamente. O uso de pino intrarradicular pré-fabricado permite preservar estrutura dentária, proporciona retenção do material restaurador, selamento do canal radicular e maior longevidade do tratamento restaurador direto. **Objetivo:** foi demonstrar o tratamento de um dente tratado endodonticamente com perdas de estruturas dentais na coroa através da técnica direta de restauração com pino de fibra de vidro e resina composta. **Relato de caso:** Paciente com 40 anos, gênero masculino, leucoderma, procurou a clínica de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente (UNOESTE), queixando-se da estética dos incisivos superiores, foram realizadas restaurações diretas de resina composta com pinos intrarradiculares de pino de fibra de vidro. **Conclusão:** As restaurações diretas de resina composta com pinos intrarradiculares são uma alternativa restauradora estética conservadora, pois, há preservação da estrutura dental e proporciona, ao final do tratamento, restabelecimento: da função, biomecânica e estética do dente que contribui com a recuperação satisfatória de uma boa harmonia do sorriso.

KAREN KANADA, YNGRID COLLETE LUZ, CYNTHIA D. T. TORRES NEVES.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O cádmio é um metal pesado que pode dar origem a osteopenia, osteoporose e osteomalácia, resultando em aumento da fragilidade do tecido ósseo e fraturas patológicas.

Objetivo: Avaliar o efeito do pH da água na gênese da lesão óssea provocada pela intoxicação por cádmio. **Material e Método:** Utilizamos 90 ratos divididos em 6 grupos, de 15 animais cada: A - Receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B - Solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C - Solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico (pH 8,0). D - Água de beber com pH ácido (pH 5,0); E Água de beber com pH básico (pH 8,0); F : Água de beber com pH neutro (pH 7,0). A eutanásia ocorreu 6 meses após o início do experimento e tiveram o fêmur direito retirado para análise radiográfica através de um aparelho radiográfico periapical. Para análise da densidade óssea, utilizamos o software image J. **Resultados:** Os grupos A, B e C apresentaram níveis de cinza na cabeça e diáfise menores que os grupos D, E e F ($p < 0,05$). Porém, não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos A, B e C ($p > 0,05$) e nem outros grupos D, E e F. ($p > 0,05$). **Conclusão:** O Cádmio reduziu a densidade óssea da cabeça e da diáfise do fêmur dos animais expostos, demonstrado através dos menores níveis de cinza na análise da imagem, porém o pH da água não interferiu.

GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA, TAYANE CARVALHO ISIDORO DA SILVA, GISELE ALBORGHETTI NAI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O processo de cicatrização de feridas cutâneas envolve vários componentes celulares importantes e fatores colaboradores. O ácido ascórbico é importante para síntese de colágeno. **Objetivo:** Determinar a ação do ácido ascórbico na cicatrização das feridas cutâneas de ratos. **Material e métodos:** Utilizou-se 48 ratos Wistar, adultos, machos. Os animais foram divididos em 2 grupos: A – 24 ratos que receberam vitamina C por gavagem (340mg/kg de 12/12h diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%); B – 24 ratos, os quais receberam água e ração *ad libitum*. Foram realizadas duas incisões em cada animal. Uma foi suturada (cicatrização por 1ª intenção) e a outra não (cicatrização por 2ª intenção). Oito ratos de cada grupo foram eutanasiados no 3º, 7º e 14º dia do experimento. Após a eutanásia, foi retirado o segmento de pele contendo as áreas incisadas para análise histopatológica. **Resultados:** Observou-se diferença estatística ($p < 0.05$) entre os grupos para os parâmetros: medida das lesões por 1ª intenção com 7 dias e para cicatrização por 2ª intenção com 3 dias; reepitelização das lesões com 7 dias para 1ª intenção; crosta fibrino-leucocitária com 14 dias para 1ª intenção; quantidade de neovascularização, intensidade da inflamação, concentração de macrófagos e concentração de fibroblastos e de fibras colágenas para 1ª e 2ª intenção. **Conclusão:** O uso de vitamina C aumenta a proliferação fibroblástica e depósito de colágeno no tecido, além de diminuir a intensidade da inflamação e concentração de macrófagos, o que contribui para melhorar a cicatrização tanto de 1ª quanto de 2ª intenção.

TCC023

AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO SOBRE DOIS TIPOS BACTERIANOS

ARIELE SUGUIMOTO DE CRISTÓFANO, SUELLEN DE ARAUJO CORTÊS, SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO, LIGIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A obturação adequada dos canais com um cimento endodôntico que apresente propriedades antimicrobianas é importante para o sucesso do tratamento endodôntico. O MTA Fillapex é um cimento endodôntico à base de silicato de cálcio com poucas pesquisas a respeito de suas propriedades. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito antimicrobiano do cimento MTA Fillapex em comparação aos cimentos AH Plus, Sealapex, Sealer 26 e EndoFill sobre cepas de *Enterococcus faecalis* e *Staphylococcus aureus* após 24 e 72 horas. **Material e Método:** Foram preparadas placas de petri de vidro com meio de cultura ágar Mueller-Hinton, onde foram confeccionados poços de 4 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro, e nestes foram depositados os cimentos recém espatulados: MTA Fillapex; AH Plus; Sealapex; EndoFill e Sealer 26. Para maior confiabilidade, os testes foram realizados em triplicata, e em todas as placas, um sexto poço contendo solução de água destilada foi utilizado como controle. Foram feitas aferições dos diâmetros dos halos de inibição obtidos após 24 e 72 horas. Para análise dos resultados utilizou-se o teste estatístico de Kruskal Wallis complementado por Dunn. **Resultados:** O cimento MTA Fillapex ($0,78 \pm 2,35$) apresentou diferença estatisticamente significativa ($p < 0,01$) do controle apenas após 72 horas sobre a cultura de *Staphylococcus aureus*; e na cultura de *Enterococcus faecalis* apresentou maiores resultados tanto após 24 horas ($8 \pm 4,04$) quanto após 72 horas ($13,3 \pm 6,47$) em relação ao controle. **Conclusão:** Conclui-se que o cimento MTA Fillapex foi efetivo quanto sua ação antibacteriana.

TCC024

**ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DO BIODENTINE:
REVISÃO DE LITERATURA.**

FERNANDA CRISTINA DIAS CONCEIÇÃO, TOMÁS SOMBINI DRUZIAN, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O Biodentine é um novo material indicado para diversas situações clínicas na Endodontia, como selamento de perfurações, tampões apicais, entre outros. Por ser um novo material, deve-se avaliar suas propriedades antes do uso clínico de rotina. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo estudar das propriedades físicas, químicas e biológicas do Biodentine por meio de uma revisão de literatura. **Metodologia:** Foram acessadas base de dados para pesquisa de artigos da literatura odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2004 a 2014. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca virtual em Saúde (BVS): BVS Odontologia, LILACS, Medline, Scielo e PubMed Central. As palavras chave utilizadas foram: biodentine, cimento de silicato, endodontia, MTA, Agregado de Trióxido Mineral, reparative dentin, Tricalcium silicate-based cement, Dentine substitute e Dentalcement, isoladas e em combinação durante a pesquisa. A partir de uma lista de referências bibliográficas obtida das buscas, foram selecionados artigos e consultados para elaboração do trabalho. **Conclusão:** Com base nos dados coletados na literatura conclui-se que o Biodentine apresenta características físicas, químicas e biológicas adequadas para uso clínico.

TCC025

INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA NAS ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS

BIANCA KELLER LIMA MARTELLI, DIOGO MILANI DE MELO, GISELE ALBORGHETTI NAI, JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O cádmio (Cd) é um metal pesado e dos mais abundantes elementos não essenciais encontrados no ambiente, sendo muito utilizado na indústria. Pode ser encontrado em alguns produtos de uso odontológico. Existem evidências que apontam que o Cd pode alterar o epitélio bucal quando ingerido. **Objetivo:** Avaliar o efeito do pH da água de beber nas alterações bucais provocadas pela intoxicação por cádmio. **Material e método:** Foram utilizados 90 ratos Wistar, adultos, machos, divididos em 6 grupos: A – 15 ratos que receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B – 15 ratos que receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH ácido (pH 5,0); C – 15 ratos, os quais receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico (pH 8,0). D – 15 ratos que receberam água com pH ácido (pH 5,0); E – 15 ratos que receberam água com pH básico (pH 8,0); F – 15 ratos que receberam água com pH neutro (pH 7,0). Todos os animais foram eutanasiados 6 meses após o início do experimento. Foram retirados fragmentos da mucosa jugal, língua e glândula salivar de cada animal para análise microscópica. **Resultado:** Não foram observadas alterações na mucosa jugal, mucosa da língua ou nas glândulas salivares em nenhum dos grupos avaliados. **Conclusão:** Mesmo em alta concentração o cádmio adicionado à água de beber não mostrou causar dano a mucosa bucal ou às glândulas salivares, independente do pH da água.

ANDRESSA FONTANA, CARLA RAMOS GROSSO, JOSÉ LUIZ PARIZI.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O ameloblastoma é uma neoplasia benigna, de origem epitelial odontogênica, que afeta os maxilares, caracterizado por apresentar crescimento lento, ser assintomático, capacidade de provocar expansão óssea e, recidivar se não tratado corretamente. O tratamento dos ameloblastomas é bastante controverso na literatura, e sua abordagem pode ser feita de maneira conservadora à radical. A escolha do tratamento deve ser feita a partir da análise de alguns fatores como o tamanho, tipo e localização da lesão e idade do paciente. **Objetivo:** Verificou-se na literatura disponível as diferentes formas clinicoradiográficas que os ameloblastomas podem apresentar, bem como sua evolução, tratamento e prognóstico. **Metodologia:** Foram selecionados artigos potencialmente relevantes sobre os ameloblastomas dos maxilares, no período compreendido entre 2004 a 2013. As palavras chaves usadas na pesquisa foram: ameloblastoma, tratamento dos ameloblastomas, treatment ameloblastoma. **Conclusão:** O tratamento do ameloblastoma deve ser considerado a idade do paciente, tamanho e tipo da lesão, sua localização, quadro histológico e quadro de saúde do paciente antes de instituir qualquer tipo de tratamento, sendo a principal complicação a recidiva.

TCC027

AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES SOLVENTES

FERNANDA CHRISTOVAM SIMÕES FREITAS, RODRIGO SILVA PEREIRA, LIGIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: No retratamento endodôntico, para a desobturação dos canais podem ser utilizados solventes, estes não devem alterar a estrutura das paredes dentinárias. **Objetivo:** Avaliar a força de adesão do material obturador, após a desobturação com diferentes solventes, por meio do teste de push-out. **Materiais e métodos:** O presente trabalho utilizou raízes palatinas de molares (n=50), com comprimento de 15 mm; estas foram instrumentadas e obturadas pela técnica da condensação lateral, e após três meses, foram divididas em grupos de acordo com o solvente utilizado, como segue: GI Controle (não desobturadas); GII Eucaliptol; GIII Citrol; GIV Xilol; e GV Endosolv R[®]. A desobturação foi realizada com limas manuais pela técnica crown-down com renovação do solvente a cada 30 segundos. Foi realizada nova obturação, e logo após, e após três meses, as raízes foram submetidas à secção transversal para obtenção de *slices* com 1 mm de espessura. Foram selecionados três *slices* por raiz, sendo um de cada terço radicular, para serem submetidos ao teste de push-out para avaliar a resistência ao deslocamento da obturação; os dados da tensão (Mpa) foram analisados pelo teste de Kruskal Wallis. **Resultados:** Os resultados não demonstraram diferença estatisticamente significativa ($p > 0,01$) entre os solventes ou entre os terços radiculares; mas houve diferença ($p < 0,01$) quanto aos terços cervical e apical dos grupos controle ($2,86 \pm 1,20$; $10,51 \pm 5,34$), eucaliptol ($4,22 \pm 2,34$; $9,64 \pm 3,15$) e xilol ($3,06 \pm 1,48$; $9,26 \pm 3,29$). **Conclusão:** Concluiu-se que o tipo de solvente utilizado não influenciou a adesão do material obturador.

TCC028

AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE WINTER

ANDRÉ LUIZ DUARTE MIRANDA, SÉRGIO ANTÔNIO SEREGHETTI FILHO, DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A extração de dentes tem como objetivo a prevenção da saúde bucal, visando evitar que patologias se instalem. Por apresentarem maiores prevalências de retenção, os terceiros molares atraíram uma atenção. Em 1926 George Winter classificou esses dentes quanto as suas angulações, tendo como relação o longo eixo do segundo molar. Essa pesquisa científica tem como prioridade, uniformizar a comunicação profissional, possibilitando a transferência de informações e de experiências, gerando métodos de estudos para a escolha da técnica cirúrgica adequada. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência das posições dos terceiros molares retidos em relação à classificação de Winter. **Material e Método:** Os participantes da pesquisa foram 100 pacientes da clínica de Cirurgia, da Faculdade de Odontologia, na faixa etária de 18 a 40 anos, de ambos os sexos que necessitavam de procedimento cirúrgico de extração de terceiros molares, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2014 e para isso teriam que realizar radiografia panorâmica. Foram coletados dados do paciente, quais os terceiros molares que se apresentavam retidos e feito Classificação de Winter (1926) modificada por Marzola (1995). **Resultados:** Houve maior prevalência do sexo feminino com 62%, contra 38%. O elemento 18 apresentou-se retido em 23%; 28 em 25%; e 26% para os elementos 38 e 48. E a posição mais prevalente foi a vertical com 51% seguida pela mesial com 21%. **Conclusão:** O sexo feminino encontrou-se com maior prevalência com 62% e a posição mais prevalente foi a vertical com 51%.

CAIO PERES BELLATO, FABIO NOBORU KASAE FUDO, ADILSON DE OLIVEIRA.

Introdução: O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde merece notória preocupação quando realizado sem conformidade das normas federal, estadual e municipal. Produzidos diariamente pelos serviços de saúde, aliado ao aumento significativo de sua produção, agrava os riscos à saúde. **Objetivo:** Esse trabalho teve como objetivo perceber o comportamento de Cirurgiões Dentistas frente à coleta do lixo odontológico, considerando a importância disso para a saúde da população e para a preservação do Meio Ambiente. **Material e Método:** Foram entrevistados 50 cirurgiões dentistas aleatoriamente. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e observacional, que abordou os aspectos do gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) em clínicas e consultórios particulares. **Resultados:** Constatou-se que o lixo é separado adequadamente respeitando-se a sua condição de infectante; É bastante diversificada a forma de descarte de mercúrio contrariando as normativas que orientam essa ação, o mesmo acontecendo com o descarte dos líquidos efluentes. A coleta do lixo infectante é feita por firmas especializadas e terceirizadas gerando despesas. A maioria dos sujeitos tiveram a disciplina de biossegurança nas grades curriculares e também são formados por faculdades particulares e contam com mais de 10 anos de formados. **Conclusão:** Conclui-se que ainda é tímido o conhecimento sobre a importância de se efetuar o correto descarte de resíduos de saúde e sugerem que as autoridades públicas e as Unidades Formadoras de futuros profissionais demonstrem um “novo olhar” para essa questão que tanto compromete e pode continuar assim, pondo em risco a vida da comunidade e do meio ambiente.

TCC030

ANÁLISE IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓLEO DE COPAÍBA SOBRE *ENTEROCOCCUS FAECALIS*

MICHELI GARCIA NASCIMENTO, MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O hidróxido de cálcio é a medicação intracanal mais utilizada na Endodontia, mas é ineficaz contra o *Enterococcus faecalis*, microrganismo presente no canal radicular contaminado. O óleo de copaíba tem sido sugerido devido as suas propriedades antimicrobianas. **Objetivo:** Este trabalho avaliou a ação antimicrobiana de pasta experimental de hidróxido de cálcio e óleo de copaíba sobre *Enterococcus faecalis*. **Material e Método:** Foram utilizadas cinco placas de petri contendo BHI Agar inoculadas com *Enterococcus faecalis*. Nesse ágar foram confeccionados 5 orifícios eqüidistantes, sendo cada um destes preenchidos pela substâncias testadas: Grupo I - soro fisiológico (controle negativo), Grupo II - clorexidina a 2% (controle positivo), Grupo III - óleo de copaíba, Grupo IV - pasta de hidróxido de cálcio e soro fisiológico e Grupo V - pasta experimental de hidróxido de cálcio e óleo de copaíba. As placas foram armazenadas em estufa a 37 °C. Os halos de inibição foram mensurados nos períodos de 24, 48 e 168 horas. Os dados obtidos foram comparados estatisticamente por meio do teste Kruskal-wallis, com grau de significância de 5%. **Resultados:** A análise dos resultados demonstrou que os grupos I, IV e V não foram capazes de inibir o microrganismo, independente do tempo experimental ($p>0,05$), ao contrario do grupo II. No grupo III foram observados os maiores halos de inibição, sendo diferente dos demais grupos experimentais ($p<0,05$). **Conclusão:** Demonstrou-se a atividade antimicrobiana do óleo de copaíba. No entanto, quando associada ao hidróxido de cálcio, na forma de pasta experimental, essa não foi eficiente.

TCC031

AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTE RESINOSO E IONOMÉRICO APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES.

HUGO STARK, FLÁVIA IWAMOTO SILVA, PATRÍCIA PACITO JACOMINI, KARINE TAKAHASHI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial, que apesar de sua prevalência diminuída, ainda é considerada problema de Saúde Pública. A maioria das lesões afeta superfícies oclusais, e em crianças, os primeiros molares permanentes são mais susceptíveis, uma vez que favorecem a retenção de placa dentária. Os selantes resinosos e cimentos de ionômero de vidro são opções de materiais que podem ser utilizados para o selamento de fossas e fissuras. **Objetivo:** Este estudo tem o objetivo de avaliar comparativamente a eficácia clínica de selantes realizados com Maxxion e Fluoroshield em primeiros molares permanentes em crianças atendidas na Clínica de Odontopediatria da UNOESTE, avaliando eficácia, retenção, prevalência de cárie dentária e descoloramento marginal. **Material e Método:** Participaram desta pesquisa 35 crianças que tiveram 70 primeiros molares permanentes selados na faixa etária entre 7 e 11 anos. **Resultados:** Dos dentes selados com Maxxion, quanto a retenção foi observado que 26,6% obtiveram uma retenção total, 46,6% retenção parcial e ausente 26,6%. Quanto á cárie foi observado, ausência de cárie 93,3% e cárie superficial 6,6%. Dos dentes selados com o fluoroshield, no requisito retenção obtivemos com retenção total 86,6%, com retenção parcial 6,6%, e com ausência de retenção 6,6%. No requisito de cárie, foram observados com ausência de cárie 93,3%, e com a presença de cárie superficial 6,6%. Na descoloração marginal, foram observados com ausência 86,6%, já com a presença de descoloração marginal 6,6% e descoloração sob selante 6,6%. **Conclusão:** o selante resinoso mostrou-se superior somente no fator retenção em que se verificou diferença estatisticamente significativa ($p < 0,005$).

Resumos dos Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso

21^A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO

PRO 001

AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTES RESINOSOS APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES

BRENDA ZANFOLIN TORQUATO, HEITOR CEOLIN ARAUJO, ISABELA COPETTI FARIA, KARINE TAKAHASHI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A cárie dentária é um dos grandes problemas em Odontologia, e principalmente em Saúde Pública. Várias pesquisas sobre materiais para prevenção dessa doença já foram feitos e alguns demonstraram eficácia em potencial dos selantes resinosos. O Prevent é um selante resinoso fotopolimerizável de fôssulas e fissuras que auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores. O Fluoroshield diariamente empregado em clínica e de fácil acesso ao profissional apresenta uma formulação modificada de BIS-GMA e uretano dimetacrilato diluído. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia, retenção, prevalência de cárie e descoloramento marginal dos selantes resinosos (Fluoroshield e Prevent) na prevenção de cárie dentária em primeiros molares permanentes. **Material e Método:** Serão selecionadas 35 crianças de idade entre 7 a 11 anos que vão ser abordadas na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista para a aplicação dos selantes resinosos em primeiros molares permanentes. A avaliação da eficácia clínica destes será feita após 6 e 12 meses. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados Esperados:** Através deste estudo espera-se encontrar o material mais eficaz para a prevenção da carie dentária.

PRO 002

CONCENTRAÇÃO DE FLUORETOS PRESENTES EM DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS E SEU USO EM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE

GUILHERME KEESE, HENRIQUE FAGUNDES BEZUTTI, JULIO CESAR LOZI LACERDA, KARINE TAKAHASHI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução O fluoreto presente na placa e no esmalte pode controlar o desenvolvimento de cárie dentária, inibindo a desmineralização e ativando o processo de remineralização. Atualmente estudos científicos vêm apontando a necessidade de uso de dentifrício fluoretado de 1000 ppm em crianças de 0 a 36 meses de idade. **Objetivo:** Este estudo tem o objetivo de avaliar a relação entre dosagem de flúor em dentifrícios infantis e a prevalência de cárie dentária em crianças de 0 a 36 meses, correlacionando com os fatores de risco a cárie dentária. **Material e Método:** Participarão desta pesquisa 50 crianças frequentadoras da EMEF Jovita Terrin comparadas a 50 crianças frequentadoras da escola particular Berçário Passo a Passo, na faixa etária de 0 a 36 meses, do gênero masculino e feminino. Um questionário simplificado será aplicado às mães ou responsáveis pela criança. As crianças ainda serão abordadas em sala de aula por um examinador calibrado e um anotador, que realizarão o exame clínico da cavidade bucal da criança, estabelecendo o índice ceo-d, e farão a evidenciação do biofilme dental com pastilha evidenciadora e emprego do índice IHOS. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados esperados:** O resultado esperado é que se possa encontrar uma correlação entre uso de dentifrícios fluoretados em crianças de 0 a 36 meses de idade e a prevalência de cárie dentária, correlacionado aos fatores de risco a cárie.

PRO 003

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE QUE FAZ USO DE TERAPIA ANTIPLAQUETÁRIA

BÁRBARA MIGUÉIS MALUF, LORRAINE SOUZA LÉ, TAYNÁ DIMITRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A medicação antitrombótica oral (MAO) tem sido utilizada com sucesso para tratar uma variedade de doenças trombóticas, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a trombose venosa profunda, e para evitar doenças cardiovasculares. O quadro de hemorragia tem sido uma grande preocupação durante anos, onde já se sugeriu interrupção da medicação antitrombótica oral antes de tratamentos dentários invasivos, como extração dental. No entanto, parar este medicamento pode levar a repetição de eventos tromboembólicos, criando assim situações potencialmente perigosas, tais como, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou mesmo morte. Não há nenhuma razão para evitar o tratamento odontológico em pacientes que tomam medicamentos antiplaquetários. **Objetivo:** Relatar um ou mais casos clínicos de procedimentos invasivos em pacientes que fazem uso de terapia antiplaquetária dual com embasamento na literatura científica. **Relato de Caso:** Para o caso clínico o paciente deverá estar utilizando terapia dual antiplaquetária, ácido acetil salicílico e outro antiagregante plaquetário e será solicitado exames laboratoriais como hemograma e coagulograma. Os cuidados com hemostasia no trans e pós operatório serão rigorosos e pautados nos protocolos registrados na literatura. Instrução de higiene oral e procedimentos preventivos serão instituídos para a preservação da saúde oral e saúde geral do paciente. **Resultados Esperados:** Com esse relato esperamos demonstrar que com medidas locais de hemostasia, o atendimento cirúrgico de paciente em terapia antiplaquetária dual é segura e não é necessária a suspensão da medicação.

PRO 004

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO A ACIDENTES OCUPACIONAIS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA – REVISÃO DE LITERATURA

AGNES CIAN DE ANDRADE, CAROLINE HORII OSTI, HELOISE DOMENICE DOS SANTOS, ADILSON DE OLIVEIRA, RODRIGO CAIXETA.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Introdução: Os instrumentos perfuro-cortantes são os principais agentes causadores de acidentes ocupacionais entre os profissionais de saúde. Na odontologia, verifica-se na literatura, uma grande preocupação com estes acidentes que são frequentes durante a rotina de trabalho no consultório. No entanto sabe-se não existir nenhuma medida pós-exposição ou pós-acidente que seja totalmente eficaz e é sabido não existir profilaxia com o objetivo de reduzir o risco de transmissão da hepatite C após a ocorrência de um acidente. Desta forma, os profissionais de saúde devem estar atentos frente às medidas que reduzem riscos sob exposição a material biológico durante a prática clínica. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é verificar as diversas formas de prevenir acidentes ocupacionais e as medidas pós-acidentes adotadas para diminuir os riscos perante a possibilidade de ocorrência da infecção cruzada durante nos procedimentos de rotina no consultório odontológico. **Metodologia:** Será realizada revisão da literatura através de levantamento bibliográfico em livros e diversos periódicos científicos nacionais e internacionais, através dos canais de busca: MEDLINE, SCIELO, BBO e LILACS. **Resultados esperados:** É esperado, com este trabalho a oportunidade de revisar medidas e técnicas utilizadas na prevenção de acidentes ocupacionais e perante a sua ocorrência, elencar medidas que sejam indispensáveis para a manutenção da integridade física mental psíquico e espiritual do acidentado.

PRO 005

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE

ARIANE SANTANA NUNES, EBERTI CRISTOVÃO SANTOS, LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, KARINE TAKAHASHI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A desorganização do biofilme dental através da higienização mecânica é o meio mais eficaz para evitar processo inflamatório bucal. Existem evidências que pacientes com transtornos mentais apresentam alto índice de ansiedade e, além disso, má higienização bucal, desta forma indivíduos ansiosos são mais susceptíveis a doenças bucais, e progressão a doença periodontal. **Objetivo:** O objetivo desta pesquisa será avaliar as condições bucais periodontais e de higiene oral de pacientes psiquiátricos com transtornos de ansiedade, assistidos em instituições filantrópicas, correlacionando condições bucais encontradas, com a higiene bucal, e grau de ansiedade. **Material e Método:** Serão avaliados pacientes frequentadores dos hospitais psiquiátricos, Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, Hospital Allan Kardec, Hospital São João e pela ala psiquiátrica do Hospital Regional (HR), todos localizados na região de Presidente Prudente – SP. Será aplicado o teste de ansiedade de Beck, e, depois, realizada avaliação das condições periodontais, em exame clínico a luz natural, usando espátula de madeira e sonda OMS. Também será avaliada a higiene oral através da coloração da placa por pastilha evidenciadora e aplicação do índice IHOS. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados esperados: espera-se, através deste estudo, verificar correlação entre ansiedade e doença periodontal assim como deficiência de higiene oral, podendo prevenir o estabelecimento e progressão da doença periodontal em pacientes psiquiátricos, orientando cuidadores.

PRO 006

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INIBIÇÃO BACTERIANA DO CIMENTO ENDOSEQUENCE BC SOBRE O MICROORGANISMO *ENTEROCOCCUS FAECALIS*. TESTE *IN VITRO*.

GUSTAVO SERENA, TATIANE DE SOUZA SANTOS, VANESSA FARIAS CLIVATI, ERICKE MUCKE SILVA, GRAZIELA MORI PANUCCI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: No tratamento endodôntico, a obturação de canais radiculares tem como objetivo selar toda a extensão da cavidade endodôntica, preenchendo o espaço antes ocupado pelo tecido pulpar. Os cimentos são coadjuvantes responsáveis pelo selamento do sistema de canais radiculares, aprisionando bactérias remanescentes e preenchendo irregularidades nos canais preparados. **Objetivo:** Avaliar a capacidade de inibição bacteriana do cimento Endosequence bc frente ao *Enterococcus Faecalis*. **Material e Método:** serão usados os cimentos: Endosequence bc e AH Plus e uma placa de 24 poços de microtitulação para o experimento. Os poços terão uma das superfícies revestidas pelos cimentos e receberão 10µl de suspensão bacteriana, divididos em 5 grupos, contendo poços revestidos por Endosequence bc que receberão suspensão bacteriana imediatamente após a colocação do material nos mesmos; poços que receberão a suspensão bacteriana 2 horas após a colocação do material; poços que serão revestidos por AH Plus e receberão a suspensão bacteriana imediatamente após a colocação do material nos poços; poços revestidos por AH Plus que receberão a suspensão bacteriana 2 horas após a colocação do material nos poços; e poços que não receberão material endodôntico e receberão a suspensão bacteriana. As soluções serão semeadas em BHI ágar para formação de unidades de colônias, as quais serão posteriormente contadas. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão tabulados e submetidos ao teste de Kruskal-Wallis. **Resultados esperados:** Espera-se como resultado deste presente trabalho, observar a eficácia do cimento Endosequence bc, em inibir a atividade proliferativa do *Enterococcus Faecalis*.

PRO 007

AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORAIS E SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA

FERNANDA TENÓRIO DE FREITAS, PAMILA CAROLINE DE LIMA, VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave com características na alteração com a realidade, com isso os portadores dessa síndrome são mais predispostos a desenvolver doenças bucais por razão da diminuição das funções, por falta de motivação, por falta da coordenação motora e assim não realizando uma higiene bucal eficiente. **Objetivo:** Avaliar as possíveis alterações orais de pacientes portadores de esquizofrenia e ajudar os cirurgiões dentistas no momento do atendimento e incentivar os familiares referentes aos cuidados necessários. **Material e Método:** Serão avaliados 50 pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de esquizofrenia internados na enfermaria psiquiátrica do Hospital Regional de Presidente Prudente, a coleta dos dados será realizada pelos pesquisadores no mesmo. Após a anamnese, serão submetidos à avaliação estomatológica, compreendida pelos exames dentários, periodontais, mucosa bucal e sistema músculo esquelética para averiguação das principais manifestações orais entre pacientes esquizofrênicos: halitose, cálculo dentário, sangramento espontâneo, xerostomia, cárie, mobilidade dentária e desordem temporomandibular. **Forma de Análise dos resultados:** As variáveis coletadas serão tabuladas e submetidas a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. A análise quantitativa será o método de análise de conteúdo e análise do discurso como as formas possíveis de tratamento dos dados da pesquisa. **Resultados Esperados:** Espera-se com o presente estudo de incentivar o cirurgião dentista a dar uma atenção maior aos pacientes com esquizofrenia, por meio da identificação das alterações orais e avaliação da saúde bucal destes pacientes.

PRO 008

ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA EM ESCOLAS PÚBLICAS E ESCOLAS PARTICULARES

ANA PAULA BARBOSA SANT'ANA, CAMILA MUNHOZ SOARES, HELOISA DOS SANTO FERNANDES, JULIANE AVANISNI MARSICANO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A escovação é o método mais eficaz na remoção do biofilme dentário, é fundamental ser realizada a escovação supervisionada nas creches, pois muitas das crianças passam o dia todo na creche, fazem suas refeições e dormem por isso a necessidade de realizar a escovação para a manutenção da saúde bucal. **Objetivo:** O objetivo do presente estudo será investigar se é realizada a escovação dentária nas escolas de ensino infantil (berçários e maternais) públicas e particulares do município de Presidente Prudente – SP, adicionalmente verificar o modo de acondicionamento das escovas dentais no ambiente escolar. **Material e método:** Serão realizadas entrevistas para os diretores e professores de 39 escolas de ensino infantil, sendo 23 escolas públicas e 16 escolas particulares, a entrevista coletará dados sobre a escovação, armazenamento das escovas e origem das mesmas. O critério de inclusão na pesquisa será a escola apresentar ensino infantil (salas de berçários e maternais, com crianças apresentando faixa etária de 0 a 4 anos). **Forma de análise dos resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados esperados:** Espera-se com esse trabalho investigar como as escolas infantis realizam a escovação dentária em seus escolares, e analisar se existem diferenças entre as escolas públicas. E com isso orientar os responsáveis pelas escolas e salas de aulas sobre a importância da mesma e a melhor maneira de executá-la, promovendo assim a saúde bucal dos escolares em idade precoce.

PRO 009

**CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO ENDODONTICO:
RELATO DE CASO CLÍNICO**

ARTHUR TINA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ, RAFAEL FIABANI CORDEIRO,
MARCELO POMINI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A cirurgia paraendodôntica mostra-se como uma excelente alternativa em situações onde se necessita a resolução de problemas não solucionados pelos primeiros procedimentos, terapia endodôntica convencional e/ou retratamento dos canais radiculares. O primeiro e mais importante passo na decisão do tratamento cirúrgico é tentar determinar a causa do processo patológico perirradicular persistente. As várias modalidades cirúrgicas, utilizadas para a resolução das dificuldades, acidentes e complicações na endodontia variam desde uma simples curetagem perirradicular, apicoplastia até outras modalidades como: apicectomia, cirurgia com obturação simultânea do canal, obturação retrógrada, retroinstrumentação e retro-obturaçã o . **Objetivo:** Esse trabalho terá como objetivo descrever e justificar o tratamento cirúrgico para um paciente que se apresentou com um dente com lesão periapical extensa e presença de prótese parcial fixa com pino intrarradicular. **Relato do caso clínico:** Paciente R.L.T, sexo masculino, 48 anos, procurou a FOPP – UNOESTE para avaliação de sensibilidade dos dentes anteriores superiores. Associando os dados clínicos e radiográficos, determinou-se o diagnóstico de abscesso dentoalveolar crônico. A partir desse diagnóstico, pode-se optar pelo tratamento endodôntico convencional, via canal, que consiste na instrumentação e irrigação do canal principal, uso de medicação intracanal e obturação radicular. Devido a presença de uma prótese fixa com pino intrarradicular satisfatória e o risco para a remoção da mesma, indicou-se uma cirurgia paraendodôntica para a resolução do caso. **Resultados esperados:** Espera-se obter sucesso clínico após o tratamento, devolvendo a saúde ao paciente e divulgando o caso clínico para os cirurgiões dentistas para ampliação dos conhecimentos clínicos.

PRO 010

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DE PACIENTE COM FISSURA LABIAL PRÉ-FORAME UNILATERAL COMPLETA: RELATO DE CASO

GABRIELA ZAMBIANCHI CAETANO, MARINA MAGRINI ALEXANDRE, LETICIA BIUDES DOS SANTOS, ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES, ANTONIO CARLOS TREVISAN.
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A fissura lábio palatina é resultado da má formação congênita que afeta a estética, alimentação, fonação, respiração, oclusão e relacionada a anomalias dentárias. O tratamento de reabilitação é longo e envolve uma equipe. **Objetivo:** relatar o caso clínico de um paciente com fissura pré-forame unilateral e a partir dele buscar informações na literatura sobre as possíveis reabilitações envolvendo ações multidisciplinares; possibilitando fornecer orientação clínica aos profissionais ligados à área, em especial ao cirurgião dentista. **Relato de caso clínico:** Será mostrado um caso de uma paciente de 13 anos, fissurado, que faz parte de AFIPP (associação de apoio ao fissurado de Presidente Prudente e região) que fornece assistência odontológica, fonoaudióloga e assistência social em parceria com o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais da Universidade de São Paulo. A fissura em questão é do tipo pré-forame unilateral completa, que separa o lábio superior em duas partes e tem comunicação nasal. **Resultados esperados:** ampliar o conhecimento a respeito dos tratamentos envolvidos na reabilitação de pacientes com fissura labiopalatal nos aspectos psicológicos, fonoaudiólogos e relacionados ao cirurgião dentista. Orientando sobre cuidados a serem tomados tanto aos pais quanto aos profissionais da área da saúde. A reabilitação das fissura deve ser vista não apenas cirúrgica e funcional, mas sim, como grandes problemas envolvendo o lado psíquico, social e o bem estar.

PRO 011

ASPECTOS BUCAIS E SISTÊMICOS DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE WEST

BLENDA LOBO NOGUEIRA, MARIA JOSÉ BORGES, CRISTIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A síndrome de West (SW) é uma forma grave e rara de epilepsia em crianças, ocorrendo entre o terceiro e oitavo mês de vida, geralmente se manifestando no quinto mês. Possui diversas causas, sendo mais comum devido às disfunções orgânicas do cérebro cujas origens podem ser pré-natais, perinatais ou pós natais. **Objetivo:** Avaliar as características físico-bucais e sistêmicas de pacientes portadores de Síndrome de West que façam uso de anticonvulsivantes e comparar com portadores de outras Síndromes que não façam uso de anticonvulsivantes. **Material e Método:** Serão analisadas condições sistêmicas, uso de medicamentos, sequela da patologia de base dos portadores da Síndrome de West que fazem o uso de medicamentos anticonvulsivantes e comparadas a outras Síndromes que não usam anticonvulsivantes. A coleta de dados será feita na APAE (Associação de Pais e amigos de excepcionais) de Presidente Prudente, Clínica Odontológica de Pacientes com Necessidades Especiais da Unoeste e CEO – Centro de Especialidade Odontológica de Presidente Prudente. Forma de Análise dos resultados. Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística usando o teste Mann-Whitney para variável CPO-D e para as demais variáveis estudadas será aplicado o teste Qui-Quadrado, ambos os testes com nível de significância de 5% (Bioestat/ Belém, Pará, Brasil). **Resultados Esperados:** Esperamos com este estudo avaliar essas características para melhor atender esses pacientes, e assim proporcionar à eles uma boa saúde bucal.

PRO 012

A INTER RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA

ANDERSON COUTINHO FELICIO, ARAKEN YAMAMOTO URDIALES, FLAVIA YURI OMAE, ADILSON DE OLIVEIRA.

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Associação entre saúde oral e doença cardiovascular, tem sido, recentemente objeto de estudo e tem demonstrado que a doença periodontal pode influenciar na saúde sistêmica do indivíduo, já que, expõe o hospedeiro a inflamações crônicas que acarretam uma bacteremia, provocando o aumento do nível de proteína C reativa, dos mediadores inflamatórios e imunológicos. Por sua vez, a aterosclerose é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo de elementos fibrosos e inflamatórios provenientes de injúrias endoteliais, conferindo aumento na incidência quando associado com doenças inflamatórias crônicas. Na atualidade, sabe-se que constataadamente, a medicina periodontal representa um novo paradigma que busca entender as correlações de determinadas doenças até então consideradas isoladas e que, nessa nova ótica, são vistas como parte integrante de um todo na estrutura de saúde do ser humano. Em tempos em que se preconiza a inter e a transdisciplinaridade, a medicina periodontal força um canal aberto de comunicação entre as áreas medico-odontológica onde o diálogo traz consigo o benefício de favorecimento maior ao paciente. Este trabalho de revisão de literatura. **Objetivo:** tem como objetivo, observar a influência da doença periodontal sobre a hiperlipidemia. **Metodologia:** Será realizada a busca nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e PUBIMED. **Resultados esperados:** Esperamos encontrar com a revisão de literatura a confirmação que a doença periodontal afeta diretamente a hiperlipidemia.

PRO 013

REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTE GERIÁTRICO COM FISSURA PALATINA E LABIAL USADO IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS

BIANCA MARCON FRÉSCA, CAROLINE DE MARQUES LUCHETI, PALOMA COSTA SANTOS, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A complexidade da reabilitação oral de indivíduos com fissura de lábio e palato está diretamente relacionada com a gravidade das alterações anatômicas e funcionais determinados pela malformação e a idade em tratamento. O tratamento ideal da área palatina é fechamento por enxerto ósseo e ortodôntico quando isso não é viável, muitos casos são resolvidos com reabilitações protéticas. **Objetivo:** O objetivo deste caso clínico é descrever a reabilitação oral de um paciente geriátrico com fenda lábio-palatina usando uma prótese muco-suportada e implanto retida (overdenture). **Relato de Caso:** Paciente CJG, gênero masculino, idade 60 anos. Procurou o atendimento do Curso de Aperfeiçoamento em Implantes Osseointegráveis da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista para reabilitação protética da maxila. O paciente relatou a má formação congênita, descrevendo como uma fenda lábio palatina completa unilateral. Nenhuma alteração sistêmica foi relatada pelo paciente. Há 30 anos foi submetido a tratamento dentário e foram realizadas restaurações e instalação de uma prótese parcial removível. Entretanto, ao decorrer do tempo foi indicado a extração de todos os dentes restantes. **Resultados Esperados:** Espera-se com a apresentação do caso clínico discutir as possibilidades de reabilitação de pacientes desdentados totais e com malformações congênitas com implantes osseointegráveis. Assim, possibilitando a restauração da eficiência mastigatória, auto estima, estética, fonação conseqüentemente proporcionando melhor qualidade de vida.

PRO 014

AVALIAÇÃO DO USO DO DIMETILSUFÓXIDO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO UTILIZANDO DIFERENTES CIMENTOS RESINOSOS

BIANCA VICENZA GIOPATTO, SANDRA NEVES DE BRITO, THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A utilização de retentores intrarradiculares estéticos, como os pinos de fibra de vidro, é uma opção clinicamente viável para resolução de casos onde a perda da porção coronária é muito extensa. No entanto, o sucesso no uso de pinos de fibra de vidro depende intimamente da técnica de cimentação utilizada. O dimetilsufóxido (DMSO) é um solvente que apresenta a capacidade de melhorar a resistência de união de sistemas adesivos quando utilizado como tratamento dentinário o que pode favorecer a maior retenção de pinos de fibra de vidro no interior do conduto radicular, favorecendo o seu desempenho clínico. **Objetivo:** Esse estudo tem como objetivo avaliar a influência do DMSO na resistência de união de pinos de fibra de vidro cimentados com diferentes cimentos resinosos. **Material e Métodos:** Serão utilizados 60 incisivos centrais bovinos (n=10) recém-extraídos. As coroas serão seccionadas, as raízes serão padronizadas e tratadas endodonticamente. Pinos de fibra de vidro translúcidos serão cimentados uma resina flow de baixa contração (Surefil DSR, Dentsply) e dois cimentos convencionais (RelyX ARC, 3M ESPE) (Allcem, FGM). Nos grupos controle, os cimentos serão utilizados de acordo com as recomendações do fabricante. Nos grupos experimentais o conduto radicular será tratado com DMSO por 1 minuto previamente a cimentação dos pinos. O conjunto raiz pino será seccionada em fatias de 1 mm de espessura de fibra as quais serão submetidas ao teste de push-out. O padrão de falha será determinado utilizando-se lupa estereoscópica no aumento de 40X. **Forma de análise dos resultados:** Constatada a normalidade dos dados, será realizado o teste ANOVA Split-plot seguido do Teste de Tukey, o nível de significância será de 5%. **Resultados Esperados:** Espera-se verificar que a utilização do DMSO contribuirá para a melhora da união de cimentos resinosos à dentina para a cimentação de pinos de fibra de vidro.

PRO 015

VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO VENTRE ANTERIOR DO MÚSCULO DIGÁSTRICO

ANA CLARA CAMARGO DE OLIVEIRA, DAVID LUCAS FICHER LUPION, MONIQUE GABRIELLY BAIS, CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O músculo digástrico, pertencente ao grupo dos músculos supra-hióideos, com importância relacionada com o abaixamento da mandíbula possui dois ventres musculares, um anterior que se origina em um tendão inserido frouxamente no corpo e no corno maior do osso hioide e se dirige superior e anteriormente para próximo à sínfise da mandíbula, na fossa digástrica e outro posterior, com origem na incisura mastoidea, medial ao processo mastoideo do osso temporal e se dirige anterior e inferiormente para se inserir no tendão intermediário. Este músculo tem sido estudado para melhor conhecimento da anatomia normal e as variações anatômicas que podem ocorrer principalmente no seu ventre anterior. **Objetivo:** Descrever as variações anatômicas do ventre anterior do músculo digástrico a fim de atender as necessidades dos profissionais que atuam nessa área. **Material e método:** Serão observadas as variações anatômicas do ventre anterior do músculo digástrico em cadáveres dissecados e assim, fotografados e mensurados com paquímetro digital. **Forma de análise dos resultados:** Todos os resultados obtidos serão expressos em um formulário de anotações, observando a quantidade de variações, se uni ou bilateral do ventre anterior do músculo digástrico, assim como o seu comprimento e largura. **Resultados esperados:** Espera-se com esta pesquisa, levar aos profissionais de odontologia e de áreas afins, que atuam na região de cabeça e pescoço, a grande incidência nas variações do ventre anterior do músculo digástrico e a importância do conhecimento dessas variações para o diagnóstico clínico, planejamento cirúrgico e estadiamento de tumores na região submental.

PRO 016

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DO CONTATO PROXIMAL EM RESTAURAÇÕES CLASSE II DE RESINA COMPOSTA

DÊNYS CHRISTIAN PARRON MACEDO, JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO, KHÊNYA KAROLYNA ROCHA AGUIAR, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O almejo do ser humano pela estética perfeita é cada vez mais rotineiro. Isso acomete até mesmo órgãos dentais, surgem assim, novos métodos utilizando resinas compostas visando minimizar as possíveis complicações. Esse estudo visa analisar o ponto de contato e contorno obtidos em restaurações classe II de resina composta. **Objetivo:** Avaliar *in vitro* diferentes formas de restauração classe II em resina composta no restabelecimento do contato e contorno proximal. **Material e Método:** Serão realizados em manequim 40 preparos cavitários separados em 4 grupos (n=10) onde no grupo 1 serão utilizadas matriz metálica universal em conjunto com um porta matriz de Toflemire, no grupo 2 Unimatrix, cunha de madeira e grampo, no grupo 3 Unimatrix, cunha de madeira, grampo e espátula Contact pró e no grupo 4 Unimatrix, cunha de madeira, grampo e *inserts* de resina sendo realizadas por um pesquisador devidamente calibrado. Serão avaliados o contato e o contorno proximal por um avaliador independente. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados Esperados:** Esperamos com esse estudo orientar os Cirurgiões Dentistas em relação ao conhecimento, técnicas e materiais utilizados em restaurações classe II de resina composta e suas possíveis implicações. Evidenciando as formas de realização do tratamento utilizadas atualmente, investigando procedimentos de sucesso e sugerindo mudanças para obter longevidade do tratamento e satisfazer as necessidades do paciente.

PRO 017

AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS ADESIVAS DMSO-WET BONDING E ETHANOL-WET BONDING NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DENTINÁRIA DE SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS

GUILHERME PEREIRA MASI, MURILO DE SOUZA, LUCAS ELIAS MARQUES REIS BARBOSA, THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A produção de interfaces de união estáveis entre sistemas adesivos e a dentina ainda pode ser considerada um desafio na odontologia. A técnica alcoólica, conhecida internacionalmente como *ethanol-wet bonding* preconiza a aplicação de soluções crescentes de etanol na superfície dentinária para facilitar a difusão do sistema adesivo, melhorando assim a adesão de sistemas adesivos convencionais à dentina. Apesar dos bons resultados, essa técnica é considerada complexa e demorada para sua realização clínica, o que torna-a inviável. O dimetilsulfóxido (DMSO) é um solvente aprótico que tem como vantagem a capacidade de penetração tecidual e age como um carregador de princípios ativos para o interior de tecidos, especialmente o cutâneo. Na odontologia, o DMSO tem-se mostrado efetivo no aumento da resistência de união de sistemas adesivos convencionais à dentina, no entanto seu protocolo de aplicação é mais simples quando comparado ao protocolo da técnica alcoólica. **Objetivos:** Com isso, o objetivo desse estudo é avaliar a influência do uso do DMSO e da técnica alcoólica na resistência de união à dentina de dois sistemas adesivos convencionais. **Material e Métodos:** Serão utilizados sessenta terceiros molares humanos hígidos recém extraídos. A face oclusal será seccionada expondo uma superfície de dentina média que será restaurada com diferentes protocolos adesivos: o sistema adesivo Scotchbond, Optibond FL, Scotchbond + DMSO, Optibond FL + DMSO, Scotchbond + Etanol e Optibond FL+ Etanol. Os dentes serão seccionados em palitos e submetidos ao ensaio de microtração. **Forma de análise dos resultados:** Após análise de normalidade, será realizado o teste two-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey. **Resultados Esperados:** Espera-se verificar que o DMSO contribuirá para a melhora da resistência de união de sistemas adesivos convencionais de forma mais efetiva em relação à técnica alcoólica.

CARLA GRIGOLETTO RODRIGUES, VIVIAN FAGUNDES, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI.
PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Atualmente existem diversas terapias para substituição dos órgãos dentários, pois a perda dentária causa agravos à saúde bucal, levando a danos funcionais e estéticos. O melhor dente para substituição deveria ser feito a partir do tecido do próprio paciente. Devido aos avanços da biologia de células - tronco e da bioengenharia tecidual essa possibilidade se torna cada vez mais real. As células-tronco são um conjunto de células que tem a capacidade de auto renovação e a habilidade de dar origem a células diferenciadas. A formação e a regeneração dental a partir das células indiferenciadas tem mostrado ótimos resultados, mas a regeneração de um órgão dentário não é simples, pois seu desenvolvimento é depende de inúmeros fatores.

Objetivo: O objetivo do presente estudo será realizar um estudo sobre células-tronco em polpa dental, tendo em vista o interesse no potencial regenerativo dessas células e em relação a sua aplicabilidade na regeneração dos tecidos da polpa. **Metodologia:** Será realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca on-line na literatura. Será executada uma revisão não sistemática no período compreendido entre 2000 a 2014, em que as bases de dados serão da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme: LILACS, MEDLINE, PUBMED, Scielo e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Serão também consultados livros-texto e periódicos disponíveis nas bibliotecas do campus I da Universidade do Oeste Paulista. **Resultados esperados:** Espera-se que com esta pesquisa, estimular os profissionais da área a desenvolver estudos e projetos para que em um futuro não muito distante, o uso de células tronco na regeneração dental represente um procedimento corriqueiro, significando, assim, um grande avanço na odontologia regenerativa.

PRO 019

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – RELATO DE CASO CLÍNICO

CAROLINA BENES CARDIA, GABRIELA RIBEIRO BRANDÃO, LEONARDO SALVADOR PASOTTI, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI.

PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. Altera a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento do indivíduo. Algumas pessoas portadoras do autismo apresentam inteligência e falas intactas, enquanto outras podem apresentar sérias desordens de linguagem e no desenvolvimento cognitivo. Variações do comportamento do autista compõem um espectro autista, acomete cerca de cinco indivíduos a cada nascimento. O paciente autista apresenta dificuldades na vida diária como higienização bucal e dieta inadequada. Para conseguir uma adequada reabilitação e desenvolvimento social é necessário um enfoque multidisciplinar. O manejo odontológico em pacientes autistas é complexo devido às características comportamentais inerentes desta desordem. **Objetivo:** Esse projeto pretende avaliar métodos e abordagens efetivas para facilitar o atendimento odontológico do paciente portador do transtorno autístico e relatar caso clínico de um paciente com esse tipo de distúrbio, tornando assim a relação entre profissional dentista e paciente mais confortável e cômoda.

Relato de caso: O relato de caso clínico será desenvolvido com base nos dados do paciente L.B.M., de 15 anos, portador de autismo, natural de Presidente Prudente e residente de Pirapozinho – SP. **Resultados esperados:** Espera-se com a condução do presente estudo, tornar o atendimento de pacientes autistas mais simples, tanto ao paciente quando ao cirurgião dentista, assim permitindo as consultas de serem mais fáceis, rápidas, confortáveis, menos traumática e aproximando dessa forma o paciente portador do transtorno autístico da equipe odontológica.

EVELYN KELLYN TRINDADE SILVA, RAQUEL NARCISO PICCHI, YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI, JOSÉ MARIA BERTÃO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Os cânceres de cabeça e pescoço são o quinto tipo de câncer mais frequente e entre eles 40% acometem a cavidade bucal, sendo uma doença crônica e multifatorial. O tratamento é feito através da radioterapia que pode ser escolhida dependendo do tipo de câncer e da profundidade em que está localizado o tumor. Apesar de ser uma ótima opção para o tratamento e apresentar uma boa eficácia, pode causar alguns efeitos adversos. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação estomatológica nos paciente que estejam ou que já foram submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço. E ao término da pesquisa elaborar um protocolo de atendimento clínico, para auxiliar os cirurgiões dentistas. **Material e Método:** Será realizada uma investigação científica no Centro Paulista Oncologia no município de Presidente Prudente, onde em torno de 30 pessoas irradiadas na região de cabeça e pescoço serão avaliados, não havendo distinção de gênero, raça e idade, verificando-se as possíveis complicações na cavidade bucal. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados Esperados:** Esperamos encontrar nos pacientes que examinaremos as doenças citadas na literatura e possibilitar a elaboração de um protocolo de atendimento clínico, para auxiliar os cirurgiões dentistas na prevenção e tratamento de pessoas irradiadas de cabeça e pescoço.

PRO 021

AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS GÉIS EXPERIMENTAIS DE GOLDONI SOBRE *ENTEROCOCCUS FAECALIS*

GEOVANA GARCIA CRUZ, LORENA OLIVEIRA MENDES, NATHÁLIA EVELYN DA SILVA MACHADO, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Durante o preparo dos canais radiculares alguns microrganismos apresentam-se resistentes quanto a sua eliminação, sendo o *Enterococcus faecalis*, o principal deles. Assim, a procura de medicamentos que possam eliminá-los é fundamental para o sucesso endodôntico.

Objetivo: Esta pesquisa terá como objetivo avaliar o efeito antimicrobiano de géis experimentais de Goldoni em comparação a Clorexidina 2% sobre o *Enterococcus faecalis*. **Material e Método:** Os materiais serão submetidos ao teste de contato modificado. Serão realizados cinco grupos de acordo com o material testado: grupo I - gel experimental 1 de Goldoni; grupo II: gel experimental 2 de Goldoni; grupo III: gel experimental 3 de Goldoni; grupo IV: clorexidina 2%; e grupo V: não receberá material (controle negativo). Tubos contendo BHI, receberão 2ml dos materiais e 10µl de suspensão bacteriana, contendo 3×10^8 de *Enterococcus faecalis* (ATCC 29212). Os grupos serão mantidos em estufa à 37°C e após 1, 3 e 7 dias serão adicionados 240µl de TBS e em seguida 20µl dessa solução será semeada em BHI ágar e levado em estufa à 37°C por 24h. **Forma de Análise dos Resultados:** A contagem das UFCs será realizada por um avaliador experiente e blindado. Os dados serão anotados em tabelas e comparados estaticamente por meio do teste de Kruskall-Wallis. **Resultados Esperados:** Espera-se determinar a ação antimicrobiana dos géis experimentais de Goldoni sobre *Enterococcus faecalis*

PRO 022

O USO DO APARELHO ORTOPÉDICO DE EXPANSÃO MAXILAR TIPO MCNAMARA – RELATO DE CASO CLÍNICO

ARIELE GONÇALVES DA SILVA, GUSTAVO BALESTEIRO CARDOSO, RAFAEL BRUNO SCUCUGLIA, SÉRGIO VILHEGAS.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Um problema que afeta a maioria das crianças hoje em dia é a má oclusão, sendo a causa principal a sucção de dedos, chupetas ou mamadeiras, estes são os instrumentos que as crianças utilizam para acalantar esse vício, provocando assim mordida cruzada posterior lingual, mordida aberta anterior, palato profundo, atresia da maxila, o que acaba levando a uma respiração bucal. **Objetivo:** Com a realização completa deste caso avaliaremos as alterações esqueléticas transversais e verticais provocados pela expansão rápida da maxila, levando a sua maxila no estado de oclusão normal em relação a mandíbula. **Relato de caso:** Iremos estudar um caso de uma criança, utilizando o aparelho ortopédico de expansão rápida da maxila do tipo Mcnamara. O expansor utilizado na maxila vai promover uma separação na rafe palatina, provocando um descruzamento da mordida posterior e uma rotação anterior da maxila. O Mcnamara nada mais é que um aparelho onde os dentes posteriores são cobertos por resina fixa e associado a um parafuso tipo Hass ou Hyra. **Resultados Esperados:** através deste estudo realizaremos um descruzamento da mordida cruzada posterior lingual e um fechamento da mordida anterior.

PRO 023

AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS GÉIS EXPERIMENTAIS DE GOLDONI SOBRE *ENTEROCOCCUS FAECALIS*

GEOVANA GARCIA CRUZ, LORENA OLIVEIRA MENDES, NATHÁLIA EVELYN DA SILVA MACHADO, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Durante o preparo dos canais radiculares alguns microrganismos apresentam-se resistentes quanto a sua eliminação, sendo o *Enterococcus faecalis*, o principal deles. Assim, a procura de medicamentos que possam eliminá-los é fundamental para o sucesso endodôntico.

Objetivo: Esta pesquisa terá como objetivo avaliar o efeito antimicrobiano de géis experimentais de Goldoni em comparação a Clorexidina 2% sobre o *Enterococcus faecalis*. **Material e Método:** Os materiais serão submetidos ao teste de contato modificado. Serão realizados cinco grupos de acordo com o material testado: grupo I - gel experimental 1 de Goldoni; grupo II: gel experimental 2 de Goldoni; grupo III: gel experimental 3 de Goldoni; grupo IV: clorexidina 2%; e grupo V: não receberá material (controle negativo). Tubos contendo BHI, receberão 2ml dos materiais e 10µl de suspensão bacteriana, contendo 3×10^8 de *Enterococcus faecalis* (ATCC 29212). Os grupos serão mantidos em estufa à 37°C e após 1, 3 e 7 dias serão adicionados 240µl de TBS e em seguida 20µl dessa solução será semeada em BHI ágar e levado em estufa à 37°C por 24h. **Forma de Análise dos Resultados:** A contagem das UFCs será realizada por um avaliador experiente e blindado. Os dados serão anotados em tabelas e comparados estaticamente por meio do teste de Kruskall-Wallis. **Resultados Esperados:** Espera-se determinar a ação antimicrobiana dos géis experimentais de Goldoni sobre *Enterococcus faecalis*.

PRO 024

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS SISTÊMICAS E ESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE

CAROLINE SOARES NARDELI, ISABELA CAROLINE SAITO, JULIANA SUGUIMOTO VALÉRIO. CRISTHIANE OLIVA FERREIRA DO AMARAL.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A mielomeningocele (MMC) é causada por falha primária de fechamento do tubo neural durante o período embriológico, e é de longe a forma mais comum e devastadora de espinha bífida. **Objetivo:** Avaliar as características sistêmicas e estomatológicas de pacientes que portam a malformação congênita, mielomeningocele, podendo ou não estar associada a hidrocefalia. **Materiais e Métodos:** Será realizado um estudo descritivo, observacional, transversal em uma amostra de conveniência, no qual os voluntários serão submetidos à avaliação por meio de aplicação de entrevista estruturada nos pais ou responsáveis, pois os pacientes serão portadores de necessidades especiais, será avaliado: condições sistêmicas, uso de medicamentos, sequela da patologia de base, será realizado exame físico buco-dentário para averiguação das condições de saúde bucal destes pacientes. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística usando o teste Mann - Whitney para variável CPO-D e para as demais variáveis estudadas será aplicado o teste Qui-Quadrado, ambos os testes com nível de significância de 5% (Bioestat / Belém, Pará, Brasil). **Resultados Esperados:** Esperamos com essa investigação científica auxiliar e/ou melhorar o conhecimento de cirurgiões dentistas no método de como atender aos cuidados de crianças portadoras de mielomeningocele durante o atendimento clínico.

PRO 025

EFEITOS DO USO DE PREBIÓTICOS NA PROGRESSÃO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA POR LIGADURA EM RATOS

GABRIELA DA SILVA NOVAIS, JÉSSICA LOZANO CAPELOTI, RAISA BALDO DIAS, HERMANN BREMER NETO, LUCIANA PRADO MAIA.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica que atinge grande parte da população brasileira. Embora seu fator etiológico primário seja o biofilme dental, a resposta do hospedeiro e várias doenças sistêmicas parecem estar associadas com seu desenvolvimento e por isso estudos recentes têm focado em novas abordagens de tratamento dessa doença. A literatura vem mostrando resultados promissores no uso de probióticos no controle da gengivite e periodontite, no entanto, o uso de prebióticos ainda não foi investigado. **Objetivos:** Avaliar, por meio de análises histológica e histomorfométrica, o efeito da administração de prebiótico (Preb - ImmunowallTM) na progressão da DP em ratos com periodontite induzida por ligaduras. **Material e Método:** Serão utilizados 40 ratos machos aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: C (controle), DP (doença periodontal induzida por ligadura), C-Preb (C + administração sistêmica de prebiótico) e DP+Preb (DP + administração sistêmica de prebiótico). Nos grupos c-Preb e DP-Preb será utilizada ração balanceada incorporada com 1g do prebiótico por kg da dieta, iniciando 30 dias antes da indução da DP. Os animais serão sacrificados 14 dias após o início da indução da DP e as hemi-mandíbulas serão processadas para análise histológica e histométrica. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados obtidos serão agrupados por grupos experimentais e analisados de acordo com a normalidade, considerando o nível crítico para rejeição de hipótese de nulidade menor que 5% ($p < 0,05$). **Resultados Esperados:** Espera-se com este estudo demonstrar que o uso de prebióticos poderá ser considerado um importante aliado no tratamento da doença periodontal.

CAMILA TERESINHA NASCIMENTO DE ARAÚJO, LARA RÚBIA MIOTTO FERREIRA DOS SANTOS, NATANI CARLA CRISTOVAM, KARINE TAKAHASHI.
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Medo é uma percepção que ocasiona um estado de alerta, exposto pelo receio de fazer algo, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente, e tanto o medo quanto a ansiedade, são barreiras encontradas pelos profissionais dentistas. A fim de minimizar o medo e a ansiedade da criança, usa-se o desenho, pois para a criança é como brincar, se tornando uma técnica eficiente para análise da visão do atendimento odontológico da criança. **Objetivo:** Este estudo tem o objetivo de avaliar o grau de medo e ansiedade da criança frente ao tratamento odontológico, através da interpretação de representações sociais (desenhos) obtidos delas antes e após o atendimento odontológico. **Material e Método:** Participarão 50 crianças de 7 a 12 anos de idade, atendidas na clínica de odontopediatria da Universidade do Oeste Paulista, onde realizarão dois desenhos, sendo um antes e outro após o atendimento. Para análise serão gravados os comentários da criança sobre o seu desenho. Onde serão classificados por um examinador entre hostil ou agradável frente à visão da criança ao atendimento odontológico. **Forma de Análise dos Resultados:** Será realizada através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney e de correlações múltiplas de Dunn (5% de probabilidade) no software Biostat 5.0. **Resultados esperados:** A partir desta pesquisa, espera-se perceber a visão da criança frente ao profissional e o ambiente odontológico, podendo, assim traçar formas mais efetivas para abordagem do medo e da ansiedade infantil.

PRO 027

CIRURGIA PARENDODÔNTICA COM OBTURAÇÃO SIMULTÂNEA DOS CANAIS: RELATO DE CASO

KEILA CRISTINA CRESCÊNCIO ESPÓSITO, TAMIRES HENRIQUE DE OLIVEIRA, MARCELO POMINI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Com a evolução técnica, científica e biológica nos tratamentos de canais radiculares, há um aumento gradativo nos índices de sucessos. Diante do fracasso do tratamento endodôntico pode-se optar pelo retratamento. Contudo, nos casos em que o retratamento não é possível, a cirurgia paraendodôntica proporciona uma excelente resolução dos problemas, onde os tratamentos convencionais não foram eficazes. A cirurgia paraendodôntica se propõe a resolver os problemas resultantes dos insucessos endodônticos, uma alternativa secundária para tratamento. Todas as possibilidades de terapêutica clínica devem ser exauridas anteriormente. É necessário limpar e moldar o sistema de canais radiculares e selá-lo em três dimensões para evitar a reinfecção do dente. A obturação do canal radicular simultânea ao ato cirúrgico compreende na obturação tridimensional do canal radicular juntamente com a exposição cirúrgica do ápice dental.

Objetivo: A proposta deste trabalho é apresentar um caso clínico realizando a cirurgia paraendodôntica, com o objetivo de promover a cura dos tecidos perirradiculares. **Relato de Caso:** Será selecionado um paciente na clínica de Endodontia da Unoeste, com necessidade de tratamento. A técnica será: cirurgia com obturação simultânea dos canais, de acordo com o diagnóstico de lesão perirradicular. A pesquisa apenas será iniciada e executada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e o paciente participará após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I). **Resultados Esperados:** Espera-se realizar com sucesso a cirurgia paraendodôntica com a técnica de obturação dos canais radiculares simultânea ao ato cirúrgico, e restabelecer assim, a integridade do periodonto do paciente.

PRO 028

DSD – DIGITAL SMILE DESIGN: RELATO DE CASO CLÍNICO

LEONARDO DEL POZZO SANTANA, VITOR NOVAES DE MORAES, WELLINGTON MARCEL SOARES ALVES, GRAZIELA AVILA GALHANO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Introdução: Em um tratamento odontológico, a busca pela estética esta cada vez mais frequente. Para esse tipo de tratamento estético foi desenvolvido o programa *Digital Smile Design*, trazendo para o profissional um maior auxilio através da tecnologia, para a confecção de um planejamento do sorriso. **Objetivo:** Relatar um caso clinico estético realizado com o auxilio do protocolo DSD (Digital smile Design). **Relato de caso clínico:** Será relatado um caso clinico realizado na disciplina de Dentistica Clinica II da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente-UNOESTE, no qual será realizado um planejamento estético virtual, seguido as orientações de Coachman et al. Contaremos com a participação de uma pessoa com a idade mínima de 19 anos que irá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A Sequência do DSD é dividida em 10 etapas que serão seguidas segundo as orientações de Coachman et al (2012). **Resultados Esperados:** Esperamos que no final do tratamento com o uso do Digital Smile Design o paciente tenha um sorriso satisfatório e harmônico.