

TABELA PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS						
Apresentação Comercial	Princípio Ativo	Reconstituição	Solução p/ Infusão	Solução de diluição	Tempo de infusão	Observações
Buscopan composto injetável 4mg/500mg/ampola 5 ml	Escopolamina + dipirona sódica	SF	SF/SG 5%	IV bolus 15 ml SF Infusão: SF 100 ml	IV lento Infusão: 30 min	Observar lipotímia
Novalgina injetável – 500 mg/ml/ampola 2 ml	Dipirona sódica	AD	-	IV bolus: 8 ml AD Caso necessário aplicar 1g(4ml) diluir para 16 ml AD (seringa de 20ml)	IV lento	Pode causar hipotensão
Profenid injetável 100mg/frasco	Cetoprofeno	5 ml AD	SF/SG 5%	100 ml	Infusão: 30 min	-
Tramal injetável 50mg/ampola 1 ml	Cloridrato de tramadol	-	SF/SG 5%	100 ml	Infusão: gotejamento lento	Administração rápida pode desencadear náuseas e vômitos
Tramal injetável 100mg/ampola 2 ml	Cloridrato de tramadol	-	SF/SG 5%	100 ml	Infusão: gotejamento lento	
ANTIEMÉTICOS						
Dramin B6 DL ap 10 ml	Cloridrato de piridoxina e dimenidrinato	-	SF/SG 5%	100 ml	Infusão: 1 h	-
Plasil injetável-5mg/ml/ ampola 2 ml	Metoclopramida	AD	-	IV bolus: 8 ml AD	IV lento	Poderá ser diluído em SF 0,9% 100 ml se indicação médica
Plamet injetável-5mg/ml/ampola 2ml	Bromoprida	AD	-	IV bolus: 8 ml AD	IV lento	-
ANTIULCEROSOS						
Omeprazol 40mg/ qsp 10 ml	Omeprazol sódico	Diluyente	-	IV bolus: 10 ml Diluyente	IV lento (2,5 min)	Verificar protocolo para infusão continua se indicação médica

TABELA PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Antak 50mg/ 2ml	Cloridrato de ranitidina	AD	-	IV bolus: 8 ml AD	IV lento	-
ANTICONVULSIVANTES						
Hidantal injetável 50mg/ml/ ampola 5 ml	Fenitoína sódica	-	SF	Infusão: SF 100ml	Infusão: 1 h	-
SEDATIVOS						
Haldol injetável 5mg/ml/ ampola 1ml	Haloperidol	AD	-	IV bolus: 8 ml AD	IV lento	-
Diazepam injetável 5mg/ml/ ampola 2 ml	Valium	AD	-	IV bolus: 18 ml AD	IV direto lento	-
REPOSIÇÃO ELETROLÍTICA						
Sulfato de magnésio 10% injetável 100mg/ml/ ampola 10 ml	Sulfato de magnésio	-	SF/SG 5%	250 ml	Infusão: 30-60 min	Diluir antes da administração
KCL 19,1% injetável ampola 10ml	Cloreto de potássio	-	SF/SG 5%	250 ml	Infusão: 2 h	
ANTIARRITMICOS						
Ancoron injetável 50mg/ml/ ampola 3 ml	Cloridrato de amiodarona	-	SG 5%	250 ml	Infusão: 30 min	Flebite
DIURÉTICOS						
Furosemida injetável 10mg/ml/ ampola 2 ml	Lasix	AD	-	IV bolus: 8ml AD	IV lento	-
CORTICOESTERÓIDES						
Solu-Cortef injetável 100mg/frasco	Hidrocortisona	2 ml AD/SF	SF/SG 5%	100 ml	IV lento Infusão: 1 h	-
Solu-Cortef injetável 500mg/frasco	Hidrocortisona	5 ml AD/SF	SF/SG 5%	250 ml	IV lento Infusão: 1h	-
ANTIBIÓTICO						
Binotal Ampicilina 500mg e 1g Frasco	Amplacilina	AD 5 ml AD	SF/SG 5%	IV 500 mg 15 ml AD Infusão: 1g SF 100 ml	IV lento Infusão: > 30 min	-

TABELA PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Cipro 200 mg/bolsa 100ml 400 mg/bolsa 200 ml	Ciprofloxacino	-	-	-	Infusão: 60 min	Solução pronta para uso
Flagyl 500mg/ 100 ml	Metronidazol	-	-	-	Infusão: 30-60 min	Solução pronta para uso
Fortaz 2g Frasco	Ceftazidina	AD 10 ml	SF	SF 100 ml	Infusão: 30 min	-
Kefazol 1g Frasco	Cefazolina sódica	AD 10 ml	-	IV bolus: 10 ml AD	IV lento	-
Klaricid injetável 500mg/ Frasco	Claritromicina	AD 10 ml	SF	SF 250ml	Infusão: 60 min	-
Levaquim 500mg/ 100 ml	Levofloxacino	-	-	-	Infusão: 60 min	Solução pronta para uso
Maxcef 500mg/ 1g e 2g Frasco	Cloridrato de Cefepima	AD 10 ml	SF	100 ml	Infusão: 30 min	-
Meropenem 500mg e 1g Frasco c/ bolsa	Meropenem	-	-	Bolsa 100 ml	Infusão: 30 min	Acompanha bolsa p/ uso
Quemacetina	Cloranfenicol	AD 10 ml	SF	100 ml	Infusão: 30 min	-
Rocefin	Ceftriaxona	AD 10 ml	-	IV bolus: 10 ml AD Caso necessário aplicar 2g EV diluir em 100ml SF	IV lento	Pode ocorrer tromboflebite. A administração muito rápida pode causar crises convulsivas.
Oxacilina Sódica	Oxacilina Sódica	AD 5 ml	-	IV bolus: 15 ml AD	IV lento	-
Tazocin injetável 4,5g e 2,25g/ Frasco	Peracilina sódica + Tazobactam sódica	AD 10 ml	SF	100 ml	Infusão: 30 min	-
Unasyn 3g/ Frasco	Ampicilina sódica + Sulbactam sódica	5 ml AD/SF	SF	100 ml	Infusão: 30 min	-
Vancocina injetável 500 mg/ Frasco	Vancomicina	10 ml AD	SF/SG 5%	100 ml Caso necessário aplicar 1g diluir em 250 ml SF	Infusão: 60 min	-
Zinacef injetável 750 mg/ Frasco	Cefuroxima sódica	6 ml AD	SF	100 ml	Infusão: 30 min	-

TABELA PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ANTIFUNGICO						
Zoltec 2mg/ml/ bolsa 100 ml	Fluconazol	-	-	-	Infusão: 60 min	Solução pronta para uso
Albecet 50 mg/Fap	Anfotericina B	AD 10 ml	SG 5%	100 – 500 ml	Infusão: por gotejamento lento equipo foto	-
Mycamine 50mg/Fap e 100 mg/Fap	Micafungina sódica	AD 5 ml	SF/SG 5%	100 ml	Infusão: 60 min	Infusões mais rápidas podem resultar em reações mediadas por histamina.