

RESUMOS DE PESQUISA123

RESUMOS DE PESQUISA

DEPENDÊNCIA DE INTERNET E SUA CORRELAÇÃO COM A QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUA ASSOCIAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	124
VIA DE PARTO: INFLUÊNCIA NO TEOR DE GORDURAS DO COLOSTRO DE NUTRIZES EM MATERNIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO	125

Pesquisa (ENAPI)

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE

Ciências Biológicas

Comunicação oral

Fisiologia

DEPENDÊNCIA DE INTERNET E SUA CORRELAÇÃO COM A QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUA ASSOCIAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

ISABELA ZAMPIERI

CAMILA SANTOS MELLO VILELA

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE

O uso da internet tornou-se ferramenta de uso amplo e irrestrito, possibilitando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, proporcionando uma comunicação rápida e facilidade na busca de informações, entretanto é observada como um meio que se usado de forma abusiva e sem controle, pode provocar prejuízos significativos na vida profissional, acadêmica, social e familiar. A dependência de internet é sub-diagnosticada devido à falta de informação dos pais e às dificuldades para diagnóstico pelos profissionais. Identificar a prevalência de Dependência de Internet em estudantes do ensino médio de uma escola privada, além, de investigar a dependência de internet com a qualidade do sono e analisar as variáveis sociodemográficas. Foram avaliados 50 estudantes do ensino médio de uma escola privada de Presidente Prudente por meio da aplicação de 3 escalas intituladas como: "Internet Addiction Test" (IAT), "Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh" (PSQI) e a correlação destes achados com aplicação de uma escala com características sociodemográficas da população estudada. A dependência de internet está diretamente relacionada a má qualidade do sono, mostrando que o aumento do IAT está associado positivamente a uma pior qualidade do sono. O uso de bebida alcoólica no presente estudo não teve correlação com a dependência de internet e a presença de sono conturbado tem associação com a dependência de internet. A dependência de internet tende a aumentar com o passar do tempo, gerando cada vez mais problemas sociais na vida dos adolescentes. É importante ressaltar que, mesmo que a dependência de internet não seja diretamente uma dependência capaz de causar lesão estrutural, a maioria dos efeitos prejudiciais devem-se ao desequilíbrio criado pelo tempo excessivo gasto com a tecnologia, uma vez que a internet está disponível praticamente de forma ilimitada e livre. Identificou-se a prevalência de dependência de Internet associada a má qualidade e conturbação do sono entre estudantes do ensino médio na instituição pesquisada. A dependência de internet é aceita como um transtorno na última década e, seus sinais são comumente mascarados e justificados como sendo uma adequação social ao uso de uma ferramenta de tecnologia. Por ser um tema atual, pouco explorado e com forte impacto social e econômico, sugere-se novos estudos que possam contribuir para o diagnóstico precoce e tratamento adequado.

Pesquisa (ENAPI)

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE

Ciências Biológicas

Comunicação oral

Fisiologia

VIA DE PARTO: INFLUÊNCIA NO TEOR DE GORDURAS DO COLOSTRO DE NUTRIZES EM
MATERNIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LETICIA AGUIAR DE CAMPOS
LUCAS LIMA DE MORAES
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI
ERIKA KUSHIKAWA SAEKI
JOSSIMARA POLETTINI
GLILCIANE MORCELI

A cesariana sem indicação pode acarretar em efeitos adversos para o binômio mãe/recém-nascido, incluindo aumento do risco de infecção, complicações anestésicas e cirúrgicas, menor probabilidade de amamentar ou cessação do aleitamento até nas primeiras horas de vida do neonato. Comparar o teor de gorduras do colostro de nutrizes com a via de parto vaginal e/ou cesárea no termo e descrever as características gestacionais e os aspectos sócios demográficos maternos. Estudo prospectivo transversal. Incluídas 214 nutrizes que tiveram parto vaginal ou cesárea, atendidas em uma maternidade de Pres. Prudente de dez de 2017 a abr de 2018. A coleta realizada por ordenha manual. Dosagem de gorduras pela técnica do crematócrito. Dados pessoais, obstétricos/ gestacionais foram coletados seguindo protocolo pré-estabelecido e análise dos prontuários médicos. Todas as nutrizes foram informadas quanto à finalidade da pesquisa e assinaram o TCLE. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se teste t, ou teste Z ou teste de Mann-Whitney, com o nível de significância de 5%. Submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Faculdade do Oeste Paulista/UNOESTE e aprovado sob protocolo número 3985 conforme protocolo CAAE 67699817.8.0000.551. Os resultados referentes às 214 amostras, como dados sócios demográficos, obstétricos e perinatais dos RN foram descritos em tabelas e figuras. Foram evidenciados resultados significativos no IMC, no início da gestação foi superior no grupo de parto cesárea ($p=0,01$) e o ganho de peso foi maior em nutrizes com parto vaginal ($p=0,01$), o New Ballard apresentou mediana maior nos RN de parto vaginal ($p=0,004$). Na quantificação da porcentagem de gorduras, creme e calorias no colostro pode-se observar um resultado não significativo ao comparar a via de parto vaginal e cesárea. O presente estudo comparou a composição de gorduras do colostro em nutrizes de parto vaginal e/ou cesárea e descreveu as características sócias demográficas, obstétricas e perinatais. A cesariana pode estar associada a uma barreira para o início do aleitamento materno, interrompendo o contato mãe/RN no período pós-parto. Estudos já evidenciaram que o teor de gorduras presente no colostro é semelhante em ambos os partos. Nota-se que a via de parto por si só não resulta em uma alteração no teor de gorduras, mas sim o conjunto de variáveis durante a gestação. A via de parto vaginal ou cesárea não influenciaram na composição do teor de gorduras do colostro.
