

Guia de Habilidades

Habilidade a ser desenvolvida: Medicação Via Intradérmica (ID)

Habilidade previamente desenvolvida (Pré-requisito): Lavagem das mãos, Aspiração de medicação, Importante conhecer o local de aplicação; volume máximo a ser administrado - 0,5 mL.

Conceito: Método de administração de medicamentos diretamente na derme por meio de punção.

INDICAÇÃO: auxiliar diagnóstico; verificar sensibilidade a alérgenos e reações de hipersensibilidade; dessensibilizar; aplicar medicamentos e vacinas.

Passo	Descrição
1	Reunir o material: <ul style="list-style-type: none">• Seringa de 1 mL;• Agulha para aspiração: 25 x 7 mm ou 25 x 8 mm;• Agulha para aplicação: 13 x 4,5 mm;• Medicação prescrita;• Algodão;• Bandeja;• Luva de procedimento;• Óculos de proteção;• Máscara.
2	Lavar as mãos.
3	Aspirar o medicamento com técnica asséptica e de acordo com a prescrição.
4	Explicar o procedimento para o paciente ou responsável.
5	Colocar máscara, óculos e calçar luvas.
6	Escolher o local de aplicação, preferencialmente no antebraço 3 a 4 dedos da fossa anticubital e 5 dedos acima do punho, que não seja pigmentado ou tenha muitos pelos.
7	Apoiar o braço em uma superfície plana.
8	Proceder a limpeza com solução fisiológica ou com água e sabão.
9	Distender a pele e introduzir somente o bisel da agulha voltado para cima, formando com a pele um ângulo de 10 a 15 graus. NÃO ASPIRAR.
10	Injetar o líquido lentamente observando a formação de uma pápula.
11	Retirar a agulha sem fazer compressão do local.
12	Observar o local da aplicação.
13	Desprezar o material utilizado em recipientes adequados, retirar os EPI's, lavar as mãos.
14	Fazer as devidas anotações no prontuário.

OBSERVAÇÕES:

- O volume máximo indicado para administração no tecido intradérmico é de 0,5ml;
- Em clientes hipersensíveis aos antígenos utilizados em teste alérgico podem desenvolver uma reação anafilática grave, o que requer procedimentos emergenciais de reanimação;
- Não massagear o local de aplicação do medicamento. Isto pode causar irritação no tecido subjacente, podendo comprometer o efeito dos testes alérgicos.
- Imediatamente após a administração, aparecerá no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso (tipo casca de laranja), com bordas bem nítidas e delimitadas, desaparecendo posteriormente.

REFEÊNCIAS

BARE, B. G.; SUDDARTH, D. S. Brunner – Tratado de Enfermagem Médico – Cirúrgico. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

PORTO, C.C. Semiologia Médica. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2009.