| RESUMOS SIMPLES | 399 |
|-----------------------------|-----|
| RESUMOS DE PROJETOS | 405 |
| RELATOS DE EXPERIÊNCIA | 413 |
| ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) | 422 |

RESUMOS SIMPLES

| A MULTIDISCIPLINARIEDADE EM UM NOVO CONTEXTO TERAPÊUTICO: REABILITAÇÃO EQUEST | |
|--|-----|
| ANALISE SOBRE O CONHECIMENTO E AS AÇÕES REALIZADAS NO TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONSIDERANDO A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO | |
| ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - PERÍODO 1990 A 2010 | 402 |
| CÂNCER DE MAMA HEREDITÁRIO: TRATAMENTO COM MASTECTOMIA E RADIOTERAPIA | 403 |
| ESTUDO COMPARATIVO DA MORBIDADE HOSPITALAR SEGUNDO INTERNAÇÕES POR RESIDÊNO LOCAL DE INTERNAÇÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE (SP) NO ANO DE 2012 | |

Extensão (ENAEXT)

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

A MULTIDISCIPLINARIEDADE EM UM NOVO CONTEXTO TERAPÊUTICO: REABILITAÇÃO EQUESTRE

REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO
JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES
SANDRA SILVA LUSTOSA
MARIA TEREZA ARTERO PRADO
ANA CLAUDIA AMBIEL
JOSÉ RICARDO CECILIO JUNQUEIRA

Cada vez mais, o processo de reabilitação de pessoas com necessidades especiais depende da integração de vários profissionais, e a reabilitação equestre utiliza o cavalo com um instrumento terapêutico, juntamente com a intervenção de uma equipe multidisciplinar. Deste modo, a Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE implantou desde março de 2010, o Centro de Reabilitação Equestre, onde é desenvolvido o Programa de Extensão "Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre" cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitátia da Unoeste, sob o número de processo Ga 0066/2009, com a participação dos cursos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, zootecnia e medicina veterinária. O principal objetivo do programa é fortalecer o desenvolvimento de habilidades motoras, autoestima, competências emocionais e sociais dos praticantes atendidos, além de proporcionar aos acadêmicos dos cursos envolvidos, a oportunidade de atender pacientes com distúrbios psicomotores e neurológicos, trabalhar em equipe, conhecer o manejo e cuidados especiais com os animais, e enriquecer a formação do acadêmico, pois permite a integração entre a teoria e a prática, favorecendo o desenvolvimento de seu papel profissional. Como parte do programa, está inserido a realização de pesquisa, dando oportunidade para a continuação da aprendizagem. O programa envolve a participação de docentes e discentes dos cursos envolvidos, semanalmente no Centro de Reabilitação Equestre, Campus II da Unoeste, e conta com 2 cavalos para a realização das sessões de praticantes com necessidades especiais de Presidente Prudente e região. melhora no desenvolvimento motor, afetivo e emocional, repercutindo na qualidade de vida e na inclusão social dos praticantes. Quanto aos docentes e discentes, notou-se a possibilidade da melhor interação entre as profissões, e a oportunidade de vivenciar um tratamento em ambiente aberto e com uma visão global do praticante, o que foge dos processos tradicionais de reabilitação.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

ANALISE SOBRE O CONHECIMENTO E AS AÇÕES REALIZADAS NO TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONSIDERANDO A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

ALINE APARECIDA BURIOLA ANA CAROLINA DE FÁCCIO AZEVEDO LARA DE ALMEIDA SANTOS LEILA CRISTIANE ZANFOLIM

Introdução: A PNH (Política Nacional de Humanização) tem como base os direitos do SUS (Sistema Único de Saúde) em que a vida humana é primordial acima de qualquer outro aspecto. Por Humanização entendemos um atendimento que valorize a vida com qualidade. (BRASIL, 2004). : O presente estudo busca avaliar o conhecimento que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) detém sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), bem como identificar, se eles reconhecem em suas ações de saúde pontos estabelecidos pela PNH. Pesquisa descritiva exploratória de caráter qualitativo. Os dados foram coletados junto a 15 ACS atuantes nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de um município do Oeste Paulista, no período de Fevereiro a Maio de 2013. Utilizou-se um roteiro de entrevistas semi-estruturado com as seguintes questões norteadoras: 1) Você já ouviu falar, leu ou participou de alguma orientação sobre a Política Nacional de Humanização do SUS? a) Diante das orientações que recebeu sobre a PNH descreva detalhadamente o que conhece sobre essa política. b) Relacionado ao que você descreveu sobre a PNH diga quais as ações de saúde estabelecidas por essa política você já realizou com as famílias que acompanha? Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática e descritos conforme as categorias elencadas (BARDIN, 2011). Nas entrevistas coletadas podemos classificar duas categorias principais para analise: O nível de conhecimento teórico dos ACS sobre a PNH. O conhecimento dos ACS sobre esta política ainda é precário, demonstrando estes não saber efetivamente do que se trata e O reconhecimento de Ações realizadas pelos ACS como parte da Política Nacional de Humanização. Na maioria das vezes o ACS reconhece como humanização o que entendemos por ações das funções de Agente Comunitário de Saúde. As praticas dos ACS em sua maioria não representa a aplicabilidade da PNH, o conhecimento escasso sobre esta política, reflete em suas ações, prejudicando assim ações e estratégias a serem desenvolvidas em seu trabalho. O conhecimento do ACS sobre a política de humanização representa melhora significativa na qualidade das ações em saúde, pois estes profissionais estão participando diretamente da rotina do usuário e o conhecimento da PNH pode contribuir com ações efetivas na prevenção e promoção da saúde. Humanizar o trabalho significa entre outras coisas aproximar pessoas e garantir qualidade e resolutividade no atendimento.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Poster

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - PERÍODO 1990 A 2010

BRUNO NOVAES AZEVEDO
JANINE CRISTINA GONÇALVES
ANA FLÁVIA GAVA TRENTIN RODRIGUES
MURILO FERNANDO VIEIRA NAVARRO
SILVIA MARTOS GRION
GISELA NUNES GEA

A Assistência à Saúde compreende um dos pilares na formação de políticas de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS. A análise de seus dados auxilia na criação de políticas destinadas à Atenção Básica e a um melhor manejo na distribuição de recursos, visando aos princípios fundamentais que o norteiam: Universalidade, Equidade e Integralidade. Afinal, a informação é fundamental para a democratização da Saúde e o aprimoramento de sua gestão. o presente trabalho teve como objetivo elaborar um estudo descritivo sobre os componentes mais importantes da Assistência à Saúde do Estado de São Paulo no período entre 1990 a 2010. A partir de dados coletados juntos à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES/SP) e Sistema Único de Saúde (DATASUS), foi elaborado um estudo descritivo sobre os componentes mais importantes da Assistência à Saúde do Estado de São Paulo no período entre 1990 a 2010. A análise dos dados revelou que houve uma melhora significativa na cobertura da Atenção Básica e no número de consultas de especialidades básicas; porém, em relação ao número de leitos por mil habitantes, foi constatado que ainda existe certa disparidade nas regionais de saúde do Estado. Os resultados obtidos corroboram para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema, para comprovação das hipóteses levantadas.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

CÂNCER DE MAMA HEREDITÁRIO: TRATAMENTO COM MASTECTOMIA E RADIOTERAPIA

JOSÉ MARIA BERTÃO BERTÃO FRANCIELE BATISTA JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres. Atualmente, dois genes têm sido apontados como principais no desenvolvimento do câncer hereditário de mama: o BRCA1, BRCA2, no qual é uma doença de ciclo celular, levando a célula a um descontrole originando os tumores. A identificação dos genes envolvidos no câncer ajudam na compreensão da doença, contribuindo para um melhor diagnóstico, tornando-se mais fácil o tratamento. O diagnóstico precoce é um dos principais fatores prognósticos, de acordo com o estádio clínico da doença que se realiza a escolha terapêutica. A cirurgia tem sido um tratamento clássico para o Câncer de mama, exclusivamente para o câncer de mama hereditário. Para ser realizada a mastectomia radical modificada a equipe médica analisa o histórico familiar positivo e/ou teste positivo de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 das pacientes Descrever mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, demonstrar que as neoplasias são doenças genéticas cujas mutações dos genes originam o câncer, mostrar que o câncer de mama pode ser hereditariamente transmitido e aplicação de cirurgia que é a mastectomia radical modificada, sendo a radioterapia aplicada somente em casos específicos, enfatizar a importância da função do tecnólogo em radiologia no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Este trabalho consiste em uma revisão de literatura sobre os genes causadores do câncer de mama. Para a realização deste estudo procederam-se as seguintes etapas: identificação e delimitação do assunto, na qual se formularam palavras-chave para o levantamento bibliográfico (câncer de mama, genes BRCA1, BRCA2, radioterapia, mastectomia) e identificaram-se os termos que expressassem o seu conteúdo; delimitação do período, pesquisando-se do ano 2005 a 2012. Identificação das fontes disponíveis, tendo sido consultados livros clássicos, artigos de periódicos e sites (Scielo, INCA, entre outros) para obtenção das informações relativas ao tema estudado. Houve captura e armazenamento dos dados. . De acordo com levantamento de dados que os autores descrevem, as mutações ocorridas nos genes BRCA1, e BRCA2, induzem o descontrole do ciclo celular, gerando o desenvolvimento do tumor. O gene BRCA2 está localizado no cromossomo 13 no lócus 13q12-13, as mulheres com mutações nesse gene dispõem de 85% de probabilidade de desencadear um carcinoma de mama hereditário durante toda a vida. Além dos genes BRCA1 e BRCA2, outros genes de síndromes multicanceres que englobam o câncer de mama foram apontados, como exemplo o gene TP53, que está localizado no cromossomo 17 lócus 17p13, que é causador da síndrome de Li-Fraumeni de câncer de mama hereditário, sarcomas e outros tipos de tumores. É utilizado a mastectomia radical modificada como o tratamento cirúrgico para o câncer de mama hereditário, sendo a radioterapia como uma modalidade de terapia em casos específicos, sendo ela utilizada pela decisão médica.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Poster

ESTUDO COMPARATIVO DA MORBIDADE HOSPITALAR SEGUNDO INTERNAÇÕES POR RESIDÊNCIA E LOCAL DE INTERNAÇÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE (SP) NO ANO DE 2012

> MARIA HELENA DA SILVA ROBERTO FERREIRA CAPISTANO EDY WILSON RIBEIRO NEVES GISELA NUNES GEA

No Brasil, vem ocorrendo importante crescimento das causas externas, afetando a morbimortalidade da sua população, essas causas impõem ônus econômicos e sociais elevados, incluindo gastos hospitalares. O objetivo deste estudo foi conhecer as causas de internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mais prevalentes e seus custos no município de Presidente Prudente-SP, considerando internações por local de residência e por local de internação, no ano de 2012. Realizada pesquisa na base de dados DATASUS, onde os dados disponíveis são oriundos do sistema de informações hospitalares do SUS - SIH (Sistema de Informações Hospitalares)/SUS, gerido pelo ministério da saúde, através da secretaria de assistência à saúde, em conjunto com as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, cujo instrumento é a AIH (Autorização de Internação Hospitalar), emitida pelos hospitais no ato da internação via SUS. Os dados foram selecionados considerando como variáveis o local de internação e o local de residência, período ano de 2012, número de internações por capítulos e causa do CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) e valores das internações. Considerando a variável local de residência, a primeira causa, com 1.932 internações, foi por gravidez, parto e puerpério, das quais 1.089 foram complicações de gravidez e parto, gerando um custo de R\$ 1.067.380, seguida por Parto Único Espontâneo, ao custo de R\$ 226.142, em 442 internações. Como segunda causa aparecem os transtornos mentais e comportamentais, com 1.797 internações, a maioria devido ao uso de álcool e substâncias psicoativas, com 867 casos com gasto de R\$ 1.015.149. Entretanto, os maiores gastos foram com esquizofrenia que totalizou R\$ 2.081.626. Em terceiro lugar as doenças do aparelho circulatório, com 1.565 internações, tendo a insuficiência cardíaca como principal causa, com 368 internações ao custo de R\$ 548.372. Considerando o local de internação, a primeira causa foi os transtornos mentais e comportamentais de vida e uso de álcool com 3.944 internações, sendo que a esquizofrenia apresenta o maior custo, R\$ 3.082.620, em 836 internações. As doenças do aparelho circulatório aparecem como segunda causa de internação com 3.580, sendo a Insuficiência Cardíaca a mais comum 731 internações com gasto de R\$ 1.019.532, seguido por acidente vascular encefálico com 454 ocorrências. Gravidez parto e puerpério são a terceira causa de internações com 3.495, das quais 911 por parto único exclusivo perfazendo o total de R\$ 568.927. Verifica-se que os transtornos mentais e comportamentais representam importante causa de internação hospitalar SUS, considerando tanto os residente no município de Presidente Prudente como usuários SUS de outros municípios que procuram atendimento hospitalar em Presidente Prudente. Tal fato devese, provavelmente, ao elevado número de leitos psiquiátricos disponíveis para o atendimento aos usuários de Pres. Prudente e região.

RESUMOS DE PROJETOS

| AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADOS DE ESTUDANT DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP | |
|---|-----|
| CONHECIMENTO E PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS EM UM GRUPO DE UNIVERSITÁRIOS DA ÁRE DA SAÚDE | |
| ELETROACUPUNTURA EM ESTRIAS | 408 |
| GRUPO DE INTERVENÇÃO COM PACIENTES COM QUEIXA DE MEDO DE DIRIGIR | 409 |
| IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA DE CRYPTOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP | |
| ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA DUBLINIENSIS DA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES USUÁRIOS DE PRÓTESES TOTAIS. DETERMINAÇÃO DA SENSIBILIDADE AO FLUCONAZOL | |
| PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO NA CONCEPÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA DE UN CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO | |

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADOS DE ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

CAROLINA YUMI GUSHIKEN

Staphylococcus aureus pode causar uma grande variedade de infecções, muitas delas adquiridas no ambiente hospitalar. A grande transmissibilidade, o seu elevado potencial patogênico e a possibilidade de resistência a múltiplos antimicrobianos, são itens relevantes que contribuem para a relevância das infecções estafilocóccicas em hospitais e outros serviços de saúde. A disseminação de isolados resistentes aos antimicrobianos mais utilizados na prática clínica é um fator limitante para o tratamento das infecções estafilocócicas, como o Staphylococcus aureus resistentes a Meticilina (Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA), emergente nas últimas décadas, como o patógeno Gram-positivo predominante em infecções hospitalares. Estima-se que ele esteja envolvido em mais de 50 das infecções estafilocócicas adquiridas em serviços de saúde. Os MRSA são resistentes a todos os betalactâmicos, pois expressam um receptor de baixa afinidade para esses antibióticos. O presente trabalho tem como objetivos estudar a distribuição de isolados de Staphylococcus aureus que colonizam estudantes do curso de medicina em uma instituição de ensino superior do Estado de São Paulo, identificando a frequência de fatores de resistência a antibióticos betalactâmicos e macrolídeos. Serão coletadas amostras das fossas nasais dos alunos de medicina. Na coleta do material, serão utilizados swabs estéreis umedecidos com salina previamente esterilizada. Para a coleta, o swab será introduzido na fossa nasal anterior, fazendo movimentos circulares delicados por três vezes. Após a coleta, os materiais serão colocados no interior de tubos secos estéreis e imediatamente encaminhados ao Laboratório de Microbiologia, para realização de semeadura em placas contendo Agar Sal-Manitol, meio seletivo para Staphylococcus. Apos incubação a 37°C por 24 horas, as amostras serão submetidas ao procedimento de identificação dos microorganismos isolados. Os microrganismos que se desenvolveram nas culturas serão submetidos à coloração de Gram objetivando-se sua pureza e a observação de sua morfologia e coloração específica. Após a confirmação dessas características, serão feitas as provas de catalase e coagulase em tubo conforme preconizado por Koneman et al. (2001). Serão realizadas as provas adicionais de Maltose, Trealose, Manitol e Polimixina B, para diferenciação de outras espécies de estafilococo coagulase positiva.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

CONHECIMENTO E PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS EM UM GRUPO DE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

> FERNANDO HENRIQUE DE FARIA SAPUCCI KLEBER AUGUSTO GABRIEL LEONILDA CHIARI GALLE

O aparecimento da pílula anticoncepcional, para o controle da natalidade, promoveu em meados de 1960, a liberdade sexual, a emancipação da mulher e o início precoce da atividade sexual, sendo atualmente apontado como responsável pelo reemergência das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Estudos recentes têm indicado que a infecção por uma DST frequentemente sugere, a probabilidade de infecção por outros microorganismos, incluindo a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O HIV, apresenta alta incidência de casos independente do sexo, faixa etária e condição sexual, cuja transmissão não se dá exclusivamente pela via sexual e a co-infecção HIV e outras DSTs, se tornou um problema mundial de saúde pública. Pesquisas científicas apontam que o preservativo, permite práticas sexuais mais seguras, porque é um meio eficaz para a prevenção do HIV, de outras DST e da gravidez. Desta forma, a educação em saúde assume com relevância o compromisso de conscientizar e informar a sociedade sobre estas medidas. Universitários da área da saúde, são considerados futuros prestadores de cuidados ao portador de HIV/AIDS e outras DST, serão também responsáveis pelo desenvolvimento da consciência crítica sobre as atitudes que visam a prevenção destas doenças. Nesta pesquisa, propomos identificar o conhecimento sobre as medidas preventivas contra DSTs, em um grupo de universitários, que cursam o primeiro ano da área da saúde, com o objetivo de construir um indicador para o desenvolvimento de programas educativos específicos, para reforçar os trabalhos preventivos voltados aos jovens em diversas instituições. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista.Trata-se de um estudo transversal, de abordagem qualitativa e quantitativa, em que será aplicado um questionário que abordará as informações sobre a idade, sexo, estado civil, religião, trabalho, renda familiar visando conhecer as características dos participantes, além de conter outras questões que investigam o início da atividade sexual, uso de preservativo e conhecimento sobre a transmissão e a prevenção das DSTs. Os estudantes serão abordados em sala de aula, deverão ter idade superior a 18 anos. A análise dos dados será descritiva e para os testes de associação das variáveis será adotado o programa estatístico bioestat 5.0 e a elaboração de tabelas de contingência acompanhadas de teste de quiquadrado (X2).

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

FLFTROACUPUNTURA FM FSTRIAS

FERNANDA SILVA GALIANO
JESSICA MARIN MANGANELLI
VIRGÍNIA MARQUES
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI

A estria é uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, sinuosa, em estriações de um ou mais milímetros de largura. Quando surgem as estrias são avermelhadas, depois se tornam esbranquiçadas e abrilhantadas, também chamadas de nacaradas. Sua origem se da pela produção de glicocorticóides, ocorrendo, assim, muitas vezes durante gravidez, obesidade e adolescência. Existem inúmeros tratamentos estéticos para estrias, dentre eles a eletroacupuntura, ou seja, a utilização de eletricidade, por meio da corrente galvânica para estimulação de acupontos cutâneos. A corrente galvânica tem como objetivo provocar um processo inflamatório agudo no tecido acometido pela estria, para que haja uma regeneração do mesmo, e quando associada à acupuntura é aplicada de forma interrompida, diminuindo assim os efeitos da eletrólise. Este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência da utilização da eletroacupuntura para o tratamento das estrias atróficas por meio de revisão da literatura. Para tal, será realizada busca em bases de dados, cujo aporte teórico constituir-se-á de artigos científicos indexados nas mesmas. Os descritores a serem utilizados são: estrias, eletroacupuntura, corrente galvânica e atrofia tegumentar. A partir dos dados encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica que reúna os efeitos da eletroacupuntura em estrias atróficas.

Extensão (ENAEXT)

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

GRUPO DE INTERVENÇÃO COM PACIENTES COM QUEIXA DE MEDO DE DIRIGIR

GABRIEL VIEIRA CÂNDIDO CAROLINE DA CRUZ PAVAN CÂNDIDO ANA LUCIA SATO DE LIMA EDNA AKEMI AKASHI

O presente trabalho esta sendo desenvolvido na clínica escola de Psicologia da UNOESTE. Trata-se de um grupo terapêutico apoiado na terapia analítico comportamental, onde a partir da análises de contingências do comportamento das participantes a respeito do medo de dirigir são investigadas questões como o que causou a dificuldade de dirigir e porque esse comportamento se mantém. A análise funcional das contingências comportamentais também são requisitos para mudanças dos comportamentos tidos como disfuncionais conquistando a sonhada autonomia de dirigir das participantes. A escolha pelo trabalho em grupo baseou-se no entendimento de que o grupo possibilita vantagens, pois a terapia em grupo é possui características mais próximas da vida cotidiana e, geralmente oferece condições para o enfrentamento dos problemas de um modo mais realista. O grupo também possibilita o acolhimento na medida em que as participantes compreendem que outras pessoas possuem dificuldades semelhantes as suas, assim auxilia no contato interpessoal, na troca de experiências e também possibilita a diminuição no tempo de espera para atendimento. Apresentar as análises funcionais do comportamento das participantes do grupo, discutindo a importância deste tipo de análise para se conhecer as causas do medo de dirigir e as condições que o mantém. Apenas a partir desta análise é que se pode chegar a intervenções mais eficazes. Trata-se de um grupo terapêutico formado por cinco mulheres. São realizados encontros semanais todas as terças-feiras das 17h10min às 18h30min. Até o momento foram realizados treze encontros e a análise de contingências foi realizada pelas integrantes do grupo ao longo das semanas, enquanto participavam das atividades sugeridas em terapia.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA DE CRYPTOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CAMILA MARÇON
FERNANDO VIANA MENEZES
DANIELA VANESSA MORIS
MARCUS RODRIGUES
SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO
AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA

O gênero fúngico Cryptococcus é composto por leveduras capsuladas que apresentam capacidade de infectar e causar doença em uma larga variedade de hospedeiros, sendo C. neoformans e C. gattii as principais espécies patogênicas. Além disso, muitos trabalhos relataram a criptococose em seres humanos após exposição à excretas dessas aves, pricipalmente em indivíduos imunocomprometidos. Até o momento, poucos estudos sobre a criptococose e dados epidemiológicos foram desenvolvidos na região do oeste do estado de São Paulo, em especial em Presidente Prudente. Logo, a carência de dados sobre a epidemiologia, bem como a espécie dominante na região justifica o interesse pela busca de fontes naturais de infecção. Este trabalho objetiva verificar a ocorrência de Cryptococcus spp. em áreas públicas da cidade de Presidente Prudente; isolar fungos do gênero Cryptococcus a partir de amostras de excretas de pombos coletadas na cidade de Presidente Prudente como na Praça Nove de Julho e Monsenhor Sarrion, Catedral São Sebastião, Campos da Universidade do Oeste Paulista UNOESTE, áreas externas do Hospital Regional de Presidente Prudente HR e Santa Casa de Misericórdia; isolar fungos do gênero Cryptococcus de ocos de árvores dos gêneros (Azadirachta; Cassia, Eucalyptus, Mangifera, Psiduim e Zizyphus) presentes nos locais de coleta das amostras de excretas de pombos; e determinar a prevalência de C. neoformans e C. gattii em amostras ambientais nas diferentes localizações da cidade de Presidente Prudente. As amostras serão identificadas por métodos micológicos convencionais (características morfológicas e perfil bioquímico).

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA DUBLINIENSIS DA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES USUÁRIOS DE PRÓTESES TOTAIS. DETERMINAÇÃO DA SENSIBILIDADE AO FLUCONAZOL

FELIPE PELAEZ
LAÍS PONTES
VANESSA GOMES LIMA
MARCUS RODRIGUES
SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO
FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA
DANIELA VANESSA MORIS

Várias espécies de leveduras do gênero Candida, assim como alguns outros microrganismos, podem colonizar mucosas, pele e trato digestivo, de modo transitório ou durante longos períodos, alguns desses microorganismos são causadores de doenças. O trato gastrintestinal, colonizado por Candia spp. em até 70 da população normal, pode ser a origem de fungemia, por alterações da microbiota residente e por sua translocação. Métodos de genotipagem mostraram similaridade entre amostras colonizadoras e infectantes, sugerindo sua origem endógena, dentre as espécies não-albicans, a C. dubliniensis tem sido objeto de intensa investigação, particularmente em decorrência de sua similaridade genotípica e fenotípica com a C. albicans e da identificação de cepas resistentes a drogas antifúngicas, como o fluconazol. Este projeto visa dentificar a prevalência de colonização e de infecção da cavidade bucal pelo gênero C. dubliniensis usuários de próteses removíveis atendidos da clínica de odontologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A coleta do material de cavidade oral será feita com swabs estéreis umedecidos em solução salina a 0,9%, as amostras serão coletadas passando-se o swab nas superfícies ventral e dorsal da língua, no soalho da boca, nas mucosas jugais e nas mucosas gengivais. A seguir, o material será imerso em frasco estéril com 2,0 ml de solução salina. O material coletado, a seguir será, semeado com o próprio swab, em meio CHROMagarCandida(Difco). As placas serão incubadas à temperatura de 30ºC e as leituras serão realizadas após 24 e 48 h de incubação. A reação colorimétrica proporcionada pelo CHROMagar permitirá a confirmação de amostras puras e colônias morfologicamente distintas e identificação presuntiva de C. albicans. As colônias isoladas serão novamente repicadas em tubos de ensaio contendo meio de cultura Sabouraund Dextrose (Oxoid) e 5 % de extrato de levedura (Difco) inclinado, e incubadas por 24 h para continuação das provas de identificação.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO NA CONCEPÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

FABIOLA DE AZEVEDO MELLO LEONILDA CHIARI GALLE

O câncer de colo uterino, também chamado de cervical, é uma doença de evolução lenta e apesar dos programas de prevenção, continua sendo grande preocupação da saúde pública. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é o tumor mais frequente na população feminina, a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil em 2009, 5.063 mulheres morreu e estima-se que em 2012 serão diagnosticados 17.540 novos casos. O início precoce das relações sexuais, número de parceiros sexuais, multiparidade, antecedentes de doenças venéreas, baixa escolaridade, uso de anticoncepcional oral por tempo prolongado e tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Ultimamente a infecção persistente por HPV é demonstrada em várias pesquisas como fator importante e está presente em mais de 90% dos casos de câncer cervical. A maioria das lesões é de evolução lenta e os estágios precursores em estado não invasivo, podem ser detectados no exame citológico, oferecido pelo programa de rastreamento deste tipo de câncer no Brasil, e mesmo assim a taxa de mortalidade continua alta. O tratamento se fundamenta no diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença, tendo como parâmetro a avaliação da localização, tamanho e tipo histológico do tumor, a idade e condições de saúde da mulher. O exame preventivo de Papanicolaou é simples, de baixo custo e eficaz, tem sido adotado mundialmente para reduzir o desenvolvimento do câncer uterino porque detecta suas lesões precursoras favorecendo o tratamento imediato. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), após um resultado negativo, a realização trienal do exame é tão eficiente quanto a anual. Entretanto, apesar da eficácia do exame, a cobertura deste na população feminina brasileira é ainda baixa. Apesar da instalação do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino no Brasil e sua cobertura aumentando significativamente, ainda constata-se que a vergonha causada pelo procedimento de coleta é um dos principais fatores que impedem a adesão das mulheres ao hábito de coleta. Supomos que a exposição das partes íntimas e a posição ginecológica exigidas para a realização do exame, estão entre os fatores que esquivam as mulheres da realização do exame. Nesta pesquisa propomos analisar os fatores que interferem na prática adotada pela população feminina de uma cidade do interior do estado de São Paulo, com ênfase no conhecimento sobre as medidas preventivas do câncer do colo uterino. As participantes da pesquisa serão selecionadas de forma aleatória, contatadas em suas residências, onde serão informadas sobre a pesquisa. Aquelas com idade superior á 18 anos, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e as com idade inferior, o termo será assinado pelo responsável.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

| ASSOCIAÇÃO DE ÁCIDO GLICÓLICO E ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO DE MANCHAS SENIS41 |
|---|
| AVALIAÇÃO DA FONOFORESE NA LIPODISTROFIA GELÓIDE41 |
| EFEITOS DO ULTRA-SOM TERAPEUTICO ASSOCIADO À FONOFORESE NO TRATAMENTO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE41 |
| OS FATORES DO ENVELHECIMENTO PRECOCE41 |
| TABAGISMO NO ENVELHECIMENTO41 |
| TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA POR MEIO DA TIPAGEM SANGUÍNEA41 |
| TRATAMENTO DA HIDROLIPODISTROFIA GINÓIDE POR MEIO DA RADIOFREQUÊNCIA42 |
| TRATAMENTO ESTÉTICO DE HIPERCROMIA PÓS-INFLAMATÓRIA42 |

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

ASSOCIAÇÃO DE ÁCIDO GLICÓLICO E ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO DE MANCHAS SENIS

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI STEPHANIE DE SOUZA SÁ GISSÍULLA KATIUSCIA MIGUEL VALERIA CARDOSO MOREIRA

As manchas senis aparecem na pele por volta dos quarenta anos de idade, mas é fruto de longos períodos de exposição solar sem qualquer tipo de proteção. Elas estão presentes em todas as partes do corpo, que ficam expostas aos raios ultravioletas, e com o passar dos anos acabam tornando-se mais evidentes. Atualmente, existem inúmeros tratamentos estéticos que promovem o clareamento das manchas senis, dentre eles o tratamento com cosméticos com a aplicação de ácido glicólico, ácido Kójico, ácido mandélico, arbutim, vitamina C e outros. O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido extraído da cana-de-açúcar, que promove uma esfoliação na pele propiciando a renovação celular e estimulando maior penetração de ativos, além de estimular as fibras colágenas. Por outro lado, o ácido ascórbico é um poderoso antioxidante e despigmentante, age no sítio ativo da enzima tirosinase bloqueando sua ligação com o cobre; impedindo a formação da melanina. Este estudo de revisão terá por objetivo analisar a associação do ácido glicólico com o ácido ascórbico, para obter-se um maior efeito clareador nas manchas senis, visto que um é peeling químico e o outro um despigmentante, respectivamente. A partir dos dados encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica. O método a ser utilizado consiste em levantamento bibliográfico de artigos, livros e monografias, com as palavras-chave manchas, radiação ultravioleta, ácido ascórbico, ácido glicólico e melanina, em bases de dados como bireme, medline e scielo.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

AVALIAÇÃO DA FONOFORESE NA LIPODISTROFIA GELÓIDE

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA OLIVEIRA MARIA ELISA MARIN MARQUES

A lipodistrofia ginóide é uma afecção estética edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, não inflamatória, que atinge 85% a 95% da população feminina, sendo raramente encontrado nos homens, devido as características de células adiposas, geralmente se aparece após a puberdade e tende a ser crônica. Os locais mais acometidos são principalmente na região da coxa, nádegas e abdomem. É uma patologia que possuem alguns fatores determinantes como: fatores hormonais, predisposição genética, dietas, pertubações metabólicas do organismo em geral. Sua etiologia é complexa e envolve aspectos multifatoriais, tornando difícil o completo desaparecimento dessas alterações. O densenvolvimento e a evolução da cosmetologia e da tecnologia tem trazido muitas opções para o tratamento da lipodistrofia ginóide, inclusive o ultrassom. O ultrassom é um recurso eletroterápico utilizado com fins terapêuticos e estéticos, que tem sido muito estudado, avaliado e é amplamente utilizado como recurso terapêutico para várias disfunções estéticas, segundo pesquisas. A lipodistrofia ginóide apresenta um dos maiores desafios da medicina estética nos últimos anos, sendo que os padrões de beleza exigem das mulheres uma solução. Várias propostas terapêuticas foram postuladas, entretanto poucas com resuntados efetivos. Isso acarreta discredibilidade quanto á eficácia do tratamentos e a possível solução do problema. Tendo em vista o descontentamento do público feminino em relação a tratamentos propostos convincente, o objetivo deste relato é avaliar os efeitos do ultrassom terapêutico associado à princípio ativos no tratamento da Lipodistrofia Gelóide. Conclue-se, que a fonoforese é eficaz no tratamento da Lipodistrodia Gelóide, melhorando o aspecto geral da pele, por causar um atrito nos complexos celulares, produzindo uma micro-massagem, tendo como consequência aumento do metabolismo celular associado ao ativos, e assim a quebra da Lipodistrodia Gelóide. Procurando esclarecer conceitos novos, definições e propostas de tratamentos foram utilizadas informações que mostram a utilização de ativos como: centella asiática, ginkgo biloba, algas marinhas, equisetum e cafeína, no tratamento da da Lipodistrodia Gelóide por meio do ultrassom terapêutico.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

EFEITOS DO ULTRA-SOM TERAPEUTICO ASSOCIADO À FONOFORESE NO TRATAMENTO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI NÚBIA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES VANESSA AKEMI DOS SANTOS YAMADA MARIA ELISA MARIN MARQUES

O fibro edema gelóide (FEG) é um infiltrado edematoso do tecido conjuntivo, não inflamatório, seguido da polimerização da substância fundamental que, infiltrando nas tramas, produz uma reação fibrótica. Por ser o FEG uma afeção de natureza multifatorial, seu tratamento dispõe de inúmeros recursos. No entanto, o que mais se destaca é o ultra-som terapêutico por ser eficaz em todos os quatro estágios do FEG, podendo ser associado à fonoforese. A técnica de fonoforese consiste em um método direto, utilizando uma substancia, ou seja, um princípio ativo, com propriedades terapêuticas em forma de gel como meio de acoplamento. A fonoforese ou sonoforese consiste em aproveitar os efeitos térmicos e mecânicos responsáveis pelo aumento da permeabilidade da membrana celular, proporcionados pela onda ultra-sônica a fim de promover a penetração via transdérmica de princípios ativos contidos no meio de acoplamento. Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos terapêuticos do ultra-som associado à fonoforese no Os resultados encontrados na literatura demonstram que há redução dos tratamento do FEG. dados perimétricos e do grau de FEG, observados por meio de alterações visuais, sendo considerados satisfatórios pela melhora no aspecto geral da pele. Tratou-se de uma revisão da literatura somente de artigos publicados em periódicos indexados a Biblioteca Virtual em Saúde nas bases LILACS e SCIELO utilizando os seguintes descritores fibro edema gelóide, ultra-som e fonoforese.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

OS FATORES DO ENVELHECIMENTO PRECOCE

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI WERUSCA CAMARGO DE OLIVEIRA SOUZA WALKIRIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES

A pele é o órgão, que espelha os sinais do tempo e do envelhecimento, sendo este decorrente do desgaste natural do organismo. O envelhecimento é um processo biológico complexo, continuo que se caracteriza por alterações celulares e moleculares, com diminuição progressiva da capacidade de homeostase do organismo, senescência e morte celular, sendo variável de um individuo para outro, de órgão para órgão. A exposição solar, devido à radiação ultravioleta, intensifica o envelhecimento da pele, por ser um dos fatores do fotoenvelhecimento. Outros fatores extrínsecos do envelhecimento são poluição, tabagismo e álcool, que por sua vez são considerados como fatores nocivos ambientais e pelo metabolismo oxidativo interno. O mecanismo fisiopatológico, destas alterações complexas, causa vaso constrição por mais de 90 minutos, e esta isquemia crônica dos tecidos gera lesão das fibras elásticas e diminuição da síntese do colágeno. Já, os radicais livres podem causar lesão tissular, diretamente pela peroxidação lipídica ou indiretamente pela inativação das enzimas que em circunstancias normais protegeria o tecido da ação proteolíticas, como o inibidor da alfa 1 proteinase. Sendo assim, a pele envelhecida apresenta-se amarelada, com pigmentação irregular, enrugada, atrófica, com telangectasias e lesões pré-malignas. Desta maneira, pretende-se com este trabalho pautar a reflexão sobre o fotoenvelhecimento e seus fatores externos, tendo como plano de fundo a preocupação com a Verifica-se, que o fotoenvelhecimento ou envelhecimento extrínseco depende da relação entre o fototipo e a exposição à radiação solar. Constatou-se a presença de elastose na derme reticular superficial, mas que pode ser evitada ou retardada com proteção solar. O fotoenvelhecimento caracteriza-se por rugas profundas, pele espessada, amarelada, seca, melanoses, telangiectasias, poiquilodermia, queratoses actínicas e maior ocorrência de câncer de pele, o que leva a concluir que, a proteção contra a radiação solar é uma medida de conservação A busca de tratamentos para prevenção, controle e reversão do da saúde humana. envelhecimento, particularmente o fotoenvelhecimento, tem despertado muito interesse, nem sempre acompanhado do rigor científico necessário. Assim, este ralato, permite iniciar uma estratégia antienvelhecimento baseada na proteção.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

TABAGISMO NO ENVELHECIMENTO

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI ISABELLA SCOPARO DO ESPIRITO SANTO BRENDA PAIXÃO MORO SILVA

O envelhecimento cutâneo é um processo decorrente de várias alterações fisiológicas, que ocorrem em todo corpo, sendo mais evidente na face. Alguns fatores, como o tabagismo, interferem de forma significativa nesse processo, comprometendo o metabolismo das células e dos órgãos vitais causando diversas doenças e assim favorecendo o envelhecimento cutâneo precoce. O tabagismoaltera o metabolismo hormonal, circulatório e tecidual dos indivíduos, o que torna a pele desidratada, rugosa, acinzentada e flácida, e, além disso, é responsável por diversas doenças crônicas, tanto em fumantes ativos, quanto passivos. Sabe-se que o tabagismo faz vasoconstrição e age como oxidante do tecido, entretanto o mecanismo no qual a nicotina desencadeia a destruição do colágeno e da elastina, surgindo os sinais de flacidez e as rugas mais profundas, que dão a aparência de rosto envelhecido precisam ser mais explorados. Esse estudo terá o objetivo de analisar os efeitos nocivos do tabagismo no envelhecimento facial. dos dados encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica. Tratar-se-á de um estudo qualitativo do tipo descritivo exploratório utilizando-se como fonte a revisão bibliográfica. A pesquisa relatará os resultados encontrados na literatura, na qual o tabagismo causa envelhecimento precoce, por meio dos descritores tabagismo, envelhecimento e nicotina.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA POR MEIO DA TIPAGEM SANGUÍNEA

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI EVELINE FERRACIOLLI DIONETE SAMPAIO DE JESUS MANFRÉ MARCOS ALBERTO ZOCOLER

O tipo sanguíneo possui diversas variações reconhecidas pela medicina, tais como a cor do cabelo e dos olhos. Cada tipo sanguíneo contém a mensagem genética dos comportamentos e dietas de nossos ancestrais. Existem quatro tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Com relação ao exercício físico, as pessoas de sangue Tipo O se dão bem com exercícios intensos físicos e proteína animal, diferente do Tipo A, que deve adotar técnicas relaxantes, como a ioga ou a meditação. Já, o tipo B requer exercícios que não sejam nem muito intensos aerobicamente, nem voltados apenas ao relaxamento mental. Para o tipo AB, indica-se adotar técnicas relaxantes, como ioga e meditação. Entretanto, ainda não está claro na literatura a relação da tipagem sanguínea com as técnicas de massagem. Sabe-se que a drenagem linfática é uma técnica de massagem realizada com pressões suaves seguindo o trajeto do sistema linfático e que a massagem modeladora manual consiste em movimentos rítmicos, vigorosos e com maior pressão, que utiliza de movimentos de amassamento, pinçamento, deslizamento e torcedura. O objetivo deste estudo será verificar qual a técnica de massagem é mais indicada para pessoas de cada tipo sanguíneo. Em seguida, será realizado um estudo estatístico descritivo dos dados. Os sujeitos deste estudo serão quatro mulheres com idade entre 30 e 40 anos, cada uma com um tipo sanguíneo A, B, AB ou O, sendo os critérios de inclusão, mulheres sedentárias, que não sejam fumantes e que não tenham alterações hormonais. Previamente e ao final do estudo, será realizada a avaliação da composição corporal, por meio da perimetria para comparação do antes e depois do tratamento. O tratamento constituir-se-á da técnica de massagem denominada drenagem linfática manual, a ser realizada durante oito sessões, duas vezes por semana por um mês.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

TRATAMENTO DA HIDROLIPODISTROFIA GINÓIDE POR MEIO DA RADIOFREQUÊNCIA

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI CARLA APARECIDA SILVA BARROS BARROS JOANA DARC DA SILVA SILVA

O Fibroedema Gelóide, conhecido como celulite, é uma alteração esteticamente indesejável, de etiologia multifatorial, que acomete mulheres. A celulite é constituída por células adiposas entre a pele e o músculo, retidas no septo fibroso, o que causa projeções destas na derme. Pode ser encontrada em qualquer área em que o tecido adiposo é depositado em excesso, entretanto, a obesidade não é condição necessária para sua existência. Para fins terapêuticos da celulite são utilizados recursos manuais e eletroterápicos, sendo que, dentre os eletroterápicos está a radiofrequência, que é uma técnica que gera aquecimento do tecido subcutâneo, ativando fibroblastos, a produzirem novas fibras de colágeno e remodelarem o tecido, melhorando, assim, a elasticidade da pele. Os resultados do tratamento utilizando a radiofrequência, até então, descritos na literatura, são rápidos e progressivos e começam a aparecer a partir da terceira sessão e dependem de inúmeros fatores como idade, local de aplicação, grau de flacidez, número de sessões e manutenção dos resultados obtidos. Verificar a eficácia do tratamento da celulite utilizando a radiofrequência. Verificou-se por meio de relatos a diminuição do grau do Fibroedema Gelóide e uma melhora no aspecto geral da pele, quando utilizada a radiofrequência como tratamento estético. A radiofrequência gera calor, por meio do efeito da corrente elétrica alternada de alta frequência, nos tecidos dérmicos com densidades proporcionais ao tipo do aplicador utilizado à região aplicada. Seu objetivo é aumentar a temperatura do tecido no sentido de alcançar uma temperatura local de 36 ºC a 42ºC, o que desencadeia uma sequência de reações fisiológicas como: aquecimento do tecido, aparecimento de vasodilatação local e neocolagênes.

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

TRATAMENTO ESTÉTICO DE HIPERCROMIA PÓS-INFLAMATÓRIA

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI ELAINE RITA DOS SANTOS LOBO LOBO GABRIELA OLIVEIRA MATTARA VALERIA CARDOSO MOREIRA

A melanina é formada por um polímero protéico originado da oxidação da tirosina pela enzima tirosinase para a diidroxifenilanina (DOPA) dentro de células especializadas denominadas melanócitos. E sabe-se que, a pigmentação da pele depende da natureza química da melanina, assim como, da atividade da tirosinase nos melanócitos e da transferência da melanina aos queratinócitos. A hipercromia pós-inflamatória é um problema frequentemente encontrado e representa uma seguela de diversos processos que afetam a pele, como doenças, feridas ou procedimentos terapêuticos, entre eles: infecções, reações alérgicas, traumas físicos, queimaduras ou doenças inflamatórias. Pode-se citar, por exemplo, o ácido glicólico e o ácido kójico como agentes despigmentantes no tratamento de uma hipercromia pós-inflamatória, entretanto, há poucos relatos na literatura de tratamentos estéticos por meio de cosméticos. Por isso, o objetivo deste estudo é verificar quais os tratamentos estéticos existentes para o clareamento das hipercromias pós-inflamatórias. O tratamento com clareadores mostrou-se eficaz no tratamento da hipercromia pós-inflamatória,o que pode ser atribuído à combinação da ação esfoliativa e a ação despigmentante sobre a produção de melanina. O tratamento da hipercromia pósinflamatória é realizado à base de substâncias despigmentantes ou clareadoras da pele. Os agentes clareadores podem agir por diferentes mecanismos de ação, mas todos ligados à produção ou transferência de pigmentos. Os agentes despigmentantes relatados são: os alfahidróxiácidos, dentre eles o ácido mandélico, málico e glicólico, o ácido ascórbico e o ácido kójico.

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS)

| ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE GINÁST | 1CA |
|--|-----|
| LABORAL | 423 |

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva

Comunicação oral

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL

ROBSON CHACON CASTOLDI
VANESSA TIEMI HARO
TATIANA EMY KOIKE
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
VILMA MAYUMI TACHIBANA
CELIA APARECIDA STELLUTTI PACHIONI
OLGA CRISTINA DE MELLO MALHEIRO

O objetivo foi analisar a qualidade de vida de participantes de um programa de Ginástica Laboral. O estudo observou 48 indivíduos, pertencentes do programa Saúde Integral do Trabalhador, com idade entre 36 e 67 anos (50 ± 8,9), sendo 11 mulheres e 37 homens. Para avaliação da Qualidade de Vida, foi utilizado o instrumento genérico Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Após a aplicação dos questionários, as informações coletadas foram armazenadas em único banco de dados em Epi Info 2000. Foram observadas as variáveis relatadas por sintomas de "dor, aspectos sociais e funcionais". A amostra analisada mostrou valores de pontuação acima de 50 pontos (mediana). Além disso, o domínio "dor" foi o único a apresentar valores inferiores ao ponto estabelecido pela mediana. O programa de ginástica laboral pode contribuir para a melhora destes aspectos, principalmente naqueles que demonstram menores valores.